

Datos florísticos sobre la comarca de La Sagra (Toledo, España). II

S. Laorga (*)

Resumen: Laorga, S. *Datos florísticos sobre la comarca de La Sagra (Toledo, España), II. Lazaroa, 4: 379-381 (1982).*

Como en la primera nota (Lazaroa, 3: 363-366, 1981) se comentan brevemente algunos táxones herborizados en la comarca de La Sagra.

Abstract: Laorga, S. *Floristical data about La Sagra (Toledo, Spain), II. Lazaroa, 4: 379-381 (1982).*

Several taxa collected at La Sagra are briefly commented.

Althaea longiflora Boiss. & Reuter, *Diagn. Pl. Nov. Hisp.* 9. 1842.

Pastizales terofíticos basifilos (*Trachynion distachyae*) desarrollados entre los tomillares. MADRID: cerros próximos a la estación de Las Infantas (MAF 106698).

Andryala laxiflora DC., *Prodr.* 7: 246. 1838.

Terófito localizado en los pastizales rupestres de las cumbres de la Sierra de Nambroca. TOLEDO: Burguillos (MAF 106697).

Camphorosma monspeliaca L., *Sp. Pl.* 1: 122. 1753.

Matorrales nitrófilos (*Salsolo-Peganion*) de cerros de suelos rojizos arcillosos provistos de grandes cristales de yeso, en cuya base surgen eflorescencias salinas. TOLEDO: Huerta de Valdecarábanos, carretera al castillo de Monreal (MAF 108342).

Centaurea depressa Bieb., *Fl. Taur.-Cauc.* 2: 346. 1808.

Como arvense en los sembrados de cereales ricos en bases (*Secalium mediterraneum*). TOLEDO: Huerta de Valdecarábanos (MAF 106738).

(*) Departamento de Botánica, Facultad de Farmacia, Universidad Complutense, Madrid, 3.

Crupina crupinastrum (Moris) Vis., Fl. Dalm. 2: 42. 1847.

Comunidades terofíticas de cerros arcilloso-calizos (*Trachynion distachyae*). TOLEDO: Yuncillos, cerros próximos al río Guadarrama (MAF 106702).

Cynomorium coccineum L., Sp. Pl. 2: 970. 1753.

Parásito de *Frankenia thymifolia* Desf. y *Salsola vermiculata* L. TOLEDO: Dosbarrios, cerros de la dehesa de Monreal (MAF 108264).

Delphinium staphisagria L., Sp. Pl. 1: 531. 1753.

Comunidades subnitrófilas sombrías en olmeda (*Smyrnion perfoliati*, *Aro italicum* - *Ulmum minoris*). TOLEDO: Dosbarrios, arroyo de la Madre (MAF 106773).

Dianthus loricifolius Boiss. & Reuter, Diagn. Pl. Nov. Hisp. 7: 1842.

Tomillares sobre suelos silíceos poco desarrollados próximos al río Guadarrama (*Corynephorum - Plantaginion radicatae*). TOLEDO: Palomeque «Miradero» (MAF 108274); MADRID: Batres.

Draba muralis L., Sp. Pl. 2: 462. 1753.

Comunidades de terófitos escionitrófilos bajo encinas (*Geranio pusilli* - *Anthriscion caucalidis*). TOLEDO: cerros próximos al convento de S. Bernardo (MAF 108268).

Euphorbia minuta Loscos & Pardo, Ser. Pl. Arag. 96. 1863.

Tomillares basífilos de margas subyesíferas en compañía de *Jurinea pinnata* (Lag.) DC. TOLEDO: Tembleque, cerros próximos al río Algodor (MAF 108267).

Genista pumila (Deg. & Rev.) Vierh. subsp. *mugronensis* (Vierh.) Rivas-Martínez, Publ. Inst. Biol. Apl. 42: 119. 1967.

Taxon manchego-meridional que alcanza, en los tomillares calcícolas de Tembleque, la cuenca del Tajo (*Salvienion lavandulifoliae*). TOLEDO: Tembleque, cerros próximos al río Algodor (MAF 108265).

Hormathophylla lapeyrousiana (Jordan) Kúper subsp. *angustifolia* (Willk.) Rivas-Martínez, Acta Botanica Malacitana 2: 64. 1976.

Tomillares basífilos sobre margas calizas de los cerros miocenos próximos al río Algodor. TOLEDO: Tembleque «Espantasueños» (MAF 108269).

Lappula marginata (Bieb.) Gürke in Engler & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. 4 (3a): 107. 1895.

Comunidades de terófitos nitrófilos que se desarrollan alrededor de las madrigueras de conejos. TOLEDO: Dosbarrios, cerros de la dehesa de Monreal (MAF 108266).

Launaea pumila (Cav.) O. Kuntze, Revis. Gen. 1: 351. 1891.

Comunidades de caméfitos de cerros yesíferos miocénicos. (*Lepidion subulati*). TOLEDO: La Guardia, cerros próximos al arroyo Cedrón (MAF 108272).

Nepeta amethystina Poirlet, Encycl. Méth. Bot., Suppl. 3: 206. 1813.

Comunidades rupícolas de las carniolas pontienses en compañía de *Phagnalon rupestre* (L.) DC. TOLEDO: Cabañas de Yepes, Dosbarrios (MAF 106694).

Onobrychis saxatilis (L.) Lam., F. Fr. 2: 653. 1778.

Restos de tomillares basífilos que se conservan en sustratos arcilloso-calizos del cerro de El Aguila. TOLEDO: Villaluenga (MAF 108273).

Orchis lactea Poiret in Lam., Encycl. Méth. Bot. 4: 594. 1798.

Claros de los encinares silicícolas luso-extremadurenses con coscoja (*Pyro-Quercetum rotundifoliae quercetosum cocciferae*). TOLEDO: Mora, cerro de Buey (MAF 108270).

Salvia aethiopsis L., Sp. Pl. 1: 27. 1753.

Como ruderal viaria en los cerros margosos. TOLEDO: Seseña (MAF 107239).

Thymelaea nítida (Vahl) Endl., Gen. Pl., Suppl. 4: 65. 1847.

Taxon manchego-meridional que hemos herborizado tanto en los espartales (*Arrhenathero albi - Stipetum tenacissimae*) como en los tomillares basífilos. TOLEDO: Yepes, cerros próximos a las canteras (MAF 106694).

Trigonella gladiata Steven ex Bieb., Fl. Taur.-Cauc. 2: 222. 1808.

Majadales empraizados de *Poa bulbosa* L. (*Astragalo sesamei - Poetum bulbosae*) sobre margas yesíferas. TOLEDO: Borox, cerros próximos a la fábrica de ladrillos (MAF 108271).

Verbascum rotundifolium Ten. subsp. **haenseleri** (Boiss.) Murb., Lunds Univ. Arrskr. nov. ser. 29 (2): 401. 1933.

En los roquedos silíceos a veces ricos en bases de la comarca de la Mora. TOLEDO: Mora «Quemadillo»; Almonacid, Sierra de la Oliva; Burguillos, Sierra de Nambroca (MAF 106694, 107238).