

CONTRIBUCION AL CONOCIMIENTO DE LA
=====

FLORA SALMANTINA
=====

*SOBRE ALGUNAS "NOVEDADES" DE M. LAINZ
EN LA PROVINCIA*

por:

BARTOLOME CASASECA MENA

Al ponernos de nuevo en contacto con la flora salmantina, y hasta que el tiempo nos vaya permitiendo herborizar minuciosamente, hemos tratado de revisar lo publicado sobre tan interesante flora.

Llama nuestra atención un trabajo de LAINZ (3), en el que el autor denuncia una serie de nuevas citas para la provincia de Salamanca, gran número de las cuales habían sido citadas con anterioridad por otros botánicos que se ocuparon de esta flora.

No sabemos por qué distracción o desconocimiento bibliográfico, LAINZ, de espíritu tan severamente crítico con las publicaciones de los demás, ha olvidado esta vez el trabajo de Hoyos de Onís (2) avalado por Lázaro Ibiza, publicado en 1898, y el de Felix Antigüedad Díez (1), publicaciones en las que podía haber visto citadas la mayoría de sus pre-

tendidas novedades.

Al publicar esta nota, no nos mueve otro propósito que dar a cada uno lo suyo, y aclarar la prioridad de unas citas para el mejor conocimiento de la Flora provincial.

A continuación reseñamos las pretendidas "novedades" de LAÍNZ, indicando en cada caso la cita anterior.

1.- Velezia rigida L.

Laínez (l.c.:472) "No citada".

Por su parte Hoyos de Onís (l.c.:105) dice: "Especie comunísima en las afueras de Salamanca junto a las líneas férreas de Medina y Portugal, cerros de Cabrerizos, Los Caidos, cercanías de Ledesma, Peñaranda, Bejar y Candelario".

2.- Silene nocturna L.

Laínez (l.c.:472) "De la *Silene nocturna L.* solo existe la cita de Téllez".

Hoyos de Onís (l.c.:104): "Común en los alrededores de la capital, puente de la Salud, Zurguén, La Aldehuela, Topas, Encinas, La Granja, Alba de Tormes, Cantalapiedra, La Carolina y muchísimos puntos más de toda la provincia".

3.- Vaccaria pyramidata Med.

Laínez (l.c.:473) "Arvense no citada".

Hoyos de Onís (l.c.:105): "*Gypsophyla vaccaria Sibth.* Común en toda la provincia. Salamanca, Alba de Tormes, Los Arapiles, Peñaranda, Ledesma, Béjar, Sequeros, Tamames y Candelario".

4.- Queria hispánica L.

Laínz (l.c.:473): "No se conoce ninguna localidad precisa en la cuenca del Duero".

Hoyos de Onís (l.c.:106): "Común en las inmediaciones de Salamanca, tesos del Cementerio, Cabrerizos, Los Arapiles, Peñaranda, Cantalapiedra, Ciudad Rodrigo, Candelario y Frontera de Portugal".

5.- Cardamine hirsuta L.

Laínz (l.c.:477): "Tampoco citada".

Hoyos de Onís (l.c.:86): "Común en la parte central de la provincia, en los sitios húmedos y sombríos, en las afueras de Salamanca, el Zurguén, Alba de Tormes, Encinas, Babilafuente y La Carolina".

6.- Matthiola tristis (L.) R.Br.

Laínz (l.c.:477): "Tampoco citada".

Hoyos de Onís (l.c.:84): "Muy común en toda la provincia. Abunda en las inmediaciones de Salamanca, Ciudad Rodrigo, Alba de Tormes, Ledesma, Cantalapiedra, Candelario".

7.- Reseda phyteuma L.

Laínz (l.c.:478): "Tampoco citada".

Hoyos de Onís (l.c.:82): "También abundante esta especie en la mayor parte de la provincia, en La Carolina, Villaflores, Cantalapiedra, Baños de Ledesma".

8.- Pistorinia hispánica (L.) D.C.

Laínz (l.c.:479): "Nueva para la provincia".

Hoyos de Onís (l.c.:90): "Hemos encontrado esta especie en la mayor parte de la provincia, alrededores de Salamanca, Tesos de Cabrerizos, Villamayor, Vitigudino, Ciudad Rodrigo, Candelario, Tamames, Béjar".

9.- Lupinus luteus L.

Laínz (l.c.:480): "Nuevo para la provincia".

Hoyos de Onís (l.c.:93): "Común en las cercanías de Salamanca, El Zurguén, Santa Marta, Zorita, Baños de Ledesma, Cantalpino, La Carolina, Villaflores, Cantalapiedra".

10.- Ononis pusilla L.

Laínz (l.c.:480) "No citada de la provincia".

Hoyos de Onís (l.c.:94): "*Ononis columnae All.*
No hemos encontrado esta especie tan abundante como las especies que anteceden, existiendo en algunas dehesas de Ledesma, Alba de Tormes, Tamames y Sequeros".

11.- Ononis natrix L.

Laínz (l.c.:480): "Tampoco citada de la provincia".

Hoyos de Onís (l.c.:93): "Planta común en los alrededores de Béjar, Sequeros y muchísimos puntos de las sierras de Béjar y de Francia".

12.- Trigonella monspeliaca L.

Laínz (l.c.:481) "Tampoco citada".

Hoyos de Onís (l.c.:95): "Se encuentra esta especie en las cercanías de Ciudad Rodrigo, Ledesma, Vitigudino, Babilafuente, Peñaranda, Macotera, Béjar".

13.- Trifolium tomentosum L.

Laínz (l.c.:481) "No se cita el *T. Tomentosum L.* muy difundido, y el *T. fragiferum L.*, al menos expresamente".

Hoyos de Onís (l.c.:96): Cita el *Trifolium tomentosum L.* como planta muy abundante en las inmediaciones de la capital, Santa Marta, Cabrerizos, Los Villares, Cantalapiedra, Peñaranda y muchos puntos más. El *Trifolium fragiferum L.*

lo cita Hoyos de Onís (l.c.:95) como abundante.

14.- Astragalus stella Gou.

Laínz (l.c.:482) "Nuevo para la provincia".

Hoyos de Onís (l.c.:96): "Esta especie es común en toda la provincia, Los Pizarrales, puente de la Salud, Cabrerizos, Los Arapiles, Cantalapiedra, Béjar, Ciudad Rodrigo y Candelario".

15.- Astragalus hamosus L.

Laínz (l.c.:482) "Tampoco está citado el común *Astragalus hamosus* L."

Hoyos de Onís (l.c.:97): "Frecuente en toda la provincia. Abunda en Ledesma, Topas, Alba de Tormes, Los Arapiles, Cantalapiedra, Peñaranda, La Carolina y cercanías de Béjar".

16.- Coronilla minima L.

Laínz (l.c.:483) "Solamente existe la cita de Téllez".

Hoyos de Onís (l.c.:99): "Se encuentra en tesos de las cercanías de Ciudad Rodrigo, Béjar, Sequeros, Linares de la Sierra, Candelario, Fregeneda, Sierra de Francia, Tamames".

17.- Althaea officinalis L.

Laínz (l.c.:484) "Tampoco se ha citado la *Althaea officinalis* L."

Hoyos de Onís (l.c.:79): "Es muy común esta planta en toda la provincia. Abunda en la finca del Zurguén y Huerta Otea (junto al río Tormes) y muchos más puntos."

18.- *Erodium moschatum* L. Herit

Laínz (l.c.:484) "No se ha citado en la provincia.

Hoyos de Onís (l.c.:103): "Es bastante frecuente en los alrededores de Alba de Tormes, Baños de Ledesma, dehesas de Ciudad Rodrigo, Vitigudino, Peñaranda, inmediaciones de Béjar y Candenario".

19.- *Erodium malacoides* Willd.

Laínz (l.c.:484) "No citada de la provincia".

Hoyos de Onís, (l.c.:103): "Muy común en toda la provincia. Aldehuela, teso de la Salud, cercanías de Ledesma, Navas de Quejigal, Paradas de Arriba y muchísimos puntos más."

20.- *Scandix australis* L.

Laínz (l.c.:485) "Tampoco citada de la provincia".

Hoyos de Onís, (l.c.:117): "Encuentrase esta especie como la anterior en toda la provincia, principalmente en Cantalapiedra, Alba de Tormes, Peñaranda, Ledesma, Sequeros, Béjar, Ciudad Rodrigo y en la frontera protuguesa".

21.- *Daucus durieua* Lge.

Laínz (l.c.:486) "Pelagarcia, raro. Nuevo como el siguiente".

Hoyos de Onís (l.c.:113): "*Durieua hispanica* Boiss et Reut. Común en dehesas de Tamames, Ciudad Rodrigo, Vitigudino, frontera de Portugal y en general en toda la provincia".

22.- *Lithospermum apulum* (L.) Vahl.

Laínz (l.c.:486) "Bastante difundido. Nuevo para la provincia".

Hoyos de Onís (l.c.:124) "Muy frecuente en toda la provincia, generalmente entre las mieses y demás sitios culti-

vados. Alrededores de Salamanca, Alba de Tormes, Peñaranda, Vitigudino, Ciudad Rodrigo, Ledesma, Frotera de Portugal, y Candelario".

23.- Linaria caesia (Lag.) D.C.

Laínz (l.c.:486) "No se ha citado".

Hoyos de Onís, (l.c.:130) "Es frecuente esta especie en la parte meridional de la provincial. Abunda en la Sierra de Béjar, alrededores de Sequeros, Candelario, Puerto de Béjar, Linares de la Sierra, Cabeza de Béjar, Navacarras".

24.- Antirrhinum orontium L.

Laínz (l.c.:486) "Tejares. Nuevo para la provincia".

Hoyos de Onís (l.c.:129): "Existe en toda la provincia, inmediaciones de Salamanca, Ciudad Rodrigo, TEJARES, Baños de Calzadilla, Cantalpino, Tejadillo, Alba de Tormes, Béjar, Candelario".

25.- Anarrhinum bellidifolium (L.) Desf.

Laínz (l.c.:487) "Un ejemplar en Alba de Tormes. Nuevo para la provincia".

Hoyos de Onís (l.c.:129): "Hemos encontrado esta especie en casi toda la provincia, Peñaranda, ALBA DE TORMES, Vitigudino, Ciudad Rodrigo, Frontera de Portugal, Ledesma, Los Arapiles y Candelario".

26.- Parentucellia latifolia (L.) Caruel.

Laínz (l.c.:487) "Abundante a orillas del Tormes en La Garcesa. No se ha citado de la provincia".

Hoyos de Onís (l.c.:132): "*Eufragia latifolia* Griseb. Existe en toda la provincia".

27.- Salvia aethiopis L.

Laínz (l.c.:487) "Tampoco citada".

Hoyos de Onís (l.c.:136): "Es frecuente esta especie en las cercanías de Ciudad Rodrigo, fincas de sus alrededores y de los de Sequeros, Tamames, afueras de Béjar, Candelario".

28.- Plantago sempervirens Crantz.

Laínz (l.c.:487) "Tesos de La Flecha, raro. Igualmente nuevo".

Hoyos de Onís (l.c.:138): "*Plantago cynops L.* Es frecuente en toda la provincia, cercanías de Salamanca, Baños de Ledesma, Cantalpino, Peñaranda, La Carolina".

29.- Plantago loeflingii L.

Laínz (l.c.:487) "La Garcesa, prado silíceo. Nuevo para la provincia y muy poco citado de la submeseta durriense".

Hoyos de Onís, (l.c.:138): "Muy común en la provincia, abunda en La Carolina".

30.- Galium tricorne Stokes in With.

Laínz, (l.c.:488) "Tampoco está citado el arvense *Galium tricorne Stokes in With.*"

Hoyos de Onís (l.c.:147): "Esta planta existe en los tesos de la Salud, Cabrerizos, La Pescanta, Alba de Tormes, Los Arapiles, Peñaranda, Cantalapiedra, Sequeros y Béjar".

31.- Cephalaria syriaca (L.) Schrad.

Laínz (l.c.:488) "Arvense esporádica en Carrascal de las Barregas. No citada de la provincia ni de Portugal."

Hoyos de Onís (l.c.:149): "Común en la mayor parte de la provincia, siendo muy abundante en las inmediaciones de la capital, el Zurguén, Tejares, Zorita, Cantalapiedra, Ciudad Rodrigo, Lumbrales, Peñaranda y Alba de Tormes".

32.- *Evax pygmaea* (L.) Brot.

Laínz (l.c.:488) "Carbajosa de la Sagra, en un barbecho. No citada".

Hoyos de Onís, (l.c.:154): "Existe en algunos puntos de las sierras de Béjar y de Francia y el límite sur de la provincia, Peña de Francia, Pico Calvitero".

33.- *Crupina acuta* (Lam.) Fritz

Laínz (l.c.:490) "La Flecha y Carrascal de las Barreras. Tampoco citada".

Hoyos de Onís (l.c.:160): "*Crupina vulgaris* Cass. Especie frecuente en la parte meridional de la provincia, alrededores de Béjar, Linares, Sequeros, Tamames, Puerto de Béjar, Candelario, Sierras de Francia y Béjar".

34.- *Taraxacum pyrrhopappum* Bss. & Reut.

Laínz (l.c.:492) "Margas al norte de la ciudad. Última especie que vimos en floración, a comienzos de Julio. No se ha citado, y alcanza aquí el vértice occidental de su área conocida".

Hoyos de Onís (l.c.:164): "*Taraxacum tomentosum* Ege. Comunísimo".

35.- *Asparagus acutifolius* L.

Laínz (l.c.:493) "Santibañez del Río y teso de La Flecha. Es otra de las especies clusianas que no se han vuelto a mencionar".

Hoyos de Onís, (l.c.:56): "Es muy común en los sembrados y matorrales de las cercanías de Salamanca, Ledesma,

Peñaranda, Cantalapiedra, Ciudad Rodrigo, Vitigudino".

36.- Allium paniculatum L. ssp. pallens (L.) Gren. & Godr.

Laínz, (l.c.:493) "No citado".

Hoyos de Onís (l.c.:58): "*Allium pallens* L. Bastante frecuente en los tesitos próximos a Tejares y demás terrenos pseudo-estepáricos de la parte central. Cabrerizos, Los Arapiles, Alba de Tormes".

37.- Juncus acutiflorus Hoff.

Laínz, (l.c.:493) "Tejares. No citado".

Hoyos de Onís, (l.c.:55): "*Juncus sylvaticus* Rchb. Se encuentra en los montes próximos a Béjar y Sequeros y límite con la provincia de Cáceres".

38.- Isolepis setacea (L.) R. Br.

Laínz, (l.c.:493) "No citada".

Hoyos de Onís (l.c.:53): "*Scirpus setaceus* L. Es muy abundante en las inmediaciones de Ledesma y frontera de Portugal."

39.- Cyperus longus L. ssp. badius (Desf.) Asch. & Graeb.

Laínz, (l.c.:493) "Alba de Tormes y las Burrinas. No citado".

Hoyos de Onís, (l.c.:53): "*Cyperus badius* Desf. Encuéntrase en los mismos sitios que el anterior, también muy abundante en toda la provincia".

40.- Carex hirta L.

Laínz, (l.c.:494) "Rara a orillas del Tormes, frente al barrio de la Prosperidad. No citada"

Hoyos de Onís, (l.c.:52): "Abunda esta planta en

las orillas de los arroyos y sitios húmedos de las Sierras de Béjar y de Francia, inmediaciones de San Esteban de la Sierra, Sequeros, Puerto de Béjar, Linares y alrededores de Tamames".

41.- Bromus rubens Jord.

Laínz, (l.c.:494) "Tejares, etc. No citado".

Hoyos de Onís, (l.c.:50): "Muy común en la parte central y baja de la provincia. Salamanca, Ledesma, Alba de Tormes, etc."

42.- Cynosurus echinatus L.

Laínz, (l.c.:494) "Pelagarcia. No citado".

Hoyos de Onís, (l.c.:50): "Especie muy común en toda la provincia, particularmente en muchos puntos de la Sierra. Alrededores de Béjar, Candelario, Tamames, etc."

En resumen, las 42 especies reseñadas dadas por M. LAINZ, como "Novedades" o citadas solamente por Téllez, no son tales novedades, ni estaban citadas unicamente por ese autor, pues fueron indicadas mucho antes, por Hoyos de Onís en 1.898.

No es la primera vez que éste tenaz aficionado atribuye indebidamente citas nuevas; por ejemplo, en "Aportaciones al conocimiento de la Flora Gallega IV. (Anal. Inst. For. Inv. y Exp. año XXXVII, pág. 325, Madrid, 1966, señala *Phalaris arundinacea* L. como novedad provincial en Orense. La realidad es que ya en 1959 ("Adiciones y correcciones a la Flora de Galicia" F. Bellot y B. Casaseca, Anal. Inst. Bot. A.J. Cavanilles, tomo XVII, Vol. I, pág. 235), se había indicado la comunidad *Phalaris arundinacea* en Barco de Valdeorras. Además posteriormente, en "Sobre *Phragmitetea* en Galicia" F. Bellot (Anal. Inst. Bot. A.J. Cavanilles, tomo XXII, año 1964, pág 78), señalaba esta especie

en Barco de Valdeorras y en Arcos, La Rúa Petín, localidades ambas en la provincia de Orense. Citas muy anteriores a la de Lainz en 1966.

BIBLIOGRAFIA

=====

- 1.- 1932. ANTIGUEDAD DIEZ, F. - "Primera serie incompleta de plantas de tierra de Béjar. Imp. de F. Muñoz. Béjar. (Salamanca).
- 2.- 1898. HOYOS DE ONIS, F. - "Notas para la flora de la provincia de Salamanca. Est. Tip. de Francisco Núñez Izquierdo. Salamanca.
- 3.- 1955. LAINZ, M. - "Contribución al catálogo de la flora salmantina. Anal. Inst. Bot. A.J. Cavanilles. T. XIII, Madrid 1954.