

Mimulus moschatus Dougl. en Candelario (Sierra de Béjar)

por:

M. MAYOR con la colaboración de J. ANDRES

Departamento de Botánica. Oviedo

En Junio de 1964, acompañé a los Profesores Casaseca y Rivas Martínez a la Sierra de Béjar, con el fin de subir al Calvitero (2.403 mts. s.n.m.) y al iniciar la ascensión, nos sorprendió la presencia de una Escrofulariaceae. Como no pudimos herborizar material suficiente, y el único ejemplar que vimos se nos extravió, nos quedamos con la duda de qué taxon se trataba.

Con el fin de encontrar de nuevo esta especie me desplazé en 1967, y tuve la fortuna de hallarla abundante, en condiciones ecológicas similares a las que tenía cuando la vimos con los Profesores Casaseca y Rivas Martínez. Ocasión que aproveché para hacer su determinación como *Mimulus moschatus* Dougl.

Al mismo tiempo tomé un inventario de las especies que le acompañaban, el que a continuación transcribo:

<i>Urtica dioica</i> L.	3.4
<i>Mimulus moschatus</i> Dougl.	4.4
<i>Oenanthe crocata</i> L.	2.2
<i>Lysimachia vulgaris</i> L.	2.2
<i>Epilobium tetragonum</i> L.	1.1
<i>Cardamine hirsuta</i> L.	+

<i>Poa pratensis</i> L.	1.1
<i>Juncus inflexus</i> L.	+ .2
<i>Lotus pedunculatus</i> Cav. <i>f^a villosus</i> (Ser.) P.	
<i>Silva et Sob.</i>	1.2
<i>Galium aparine</i> L.	1.2
<i>Poa nemoralis</i> L.	+ .2
<i>Lampsana communis</i> L.	1.2
<i>Menta rotundifolia</i> L.	1.2

En Julio de 1969, con el Dr. J. Andrés visité de nuevo la zona para estudiar los pastizales formados por *Nardus stricta* L. del piso montano y al ver el *Mimulus moschatus* Dougl. levantamos otro inventario, que nos sirvió para precisar mejor su comportamiento ecológico.

El inventario estaba formado por las siguientes especies:

<i>Mimulus moschatus</i> Dougl.	4.4
<i>Oenanthe crocata</i> L.	4.5
<i>Poa nemoralis</i> L.	2.2
<i>Lysimachia vulgaris</i> L.	3.4
<i>Galium aparine</i> L.	1.2
<i>Hypericum gnadrangulum</i> L. <i>ssp. tetrapterum</i> (Fries)	
<i>Rivas Mart.</i>	3.3
<i>Urtica dióica</i> L.	2.2
<i>Menta rotundifolia</i> L.	2.3
<i>Lotus pedunculatus</i> Cav. <i>f^a</i> <i>villosus</i> (ser.) P. <i>Silva</i> <i>et Sob.</i>	+ .2
<i>Rumex crispus</i> L.	+ .2
<i>Scrofularia scorodonia</i> L.	1.2
<i>Hypericum perforatum</i> L.	+ .2

En lo que concierne a su ecología, sin poder precisar mucho, deducimos por las especies que le acompañan, que tiene preferencias por suelos higrófilos y con cierta influencia antropozoogena.

BIBLIOGRAFIA

COSTE, L'ABBE, H. (1937).- Flore descriptive et Illustré de la France. Librairie des Sciences et des Arts. Paris.

LAZARO E IBIZA (1896).- Compendio de la Flora Española. Tomo II. Librería de Hernando y Co. Madrid.