

Contribución al conocimiento de la flora de Palencia (España)

ALEJANDRO ROMERO ABELLÓ

Departamento de Biología Vegetal I. Facultad de Biología,
Universidad Complutense de Madrid. E-28040 Madrid.

Resumen.

ROMERO ABELLÓ, A. 1989. Contribución al conocimiento de la flora de Palencia (España). *Bot. Complutensis* 15:239-242.

En este trabajo se presentan 13 primeras citas para la Flora de Palencia (España).

Palabras clave: Plantas vasculares, corología, Palencia, España.

Abstract.

ROMERO ABELLÓ, A. 1989. Contribution to the knowledge of the flora of Palencia (Spain). *Bot. Complutensis* 15: 239-242 (in Spanish).

This paper states thirteen first records for the Flora of Palencia (Spain).

Key words: Vascular plants, chorology, Palencia, Spain.

INTRODUCCIÓN

En estas notas presentamos algunas citas corológicas interesantes de taxones herborizados en las comarcas orientales de la Tierra de Campos palentina.

Esta zona está caracterizada por la presencia de un conjunto de cerros calizos, cuyas altitudes oscilan alrededor de los 800 m, separados por los valles de los ríos Carrión, Pisuerga, Arlanza y Arlanzón.

Fisionómicamente se distinguen tres unidades diferenciadas, los páramos calizos, en la cima de los cerros, donde se encuentran manchas de encinar-quejigar alternadas con cultivos cerealistas; las cuevas margosas de los cerros, con abundantes afloramientos de yesos, colonizadas por un matorral bastante degradado y que en algunos lugares han sido aterradas y repobladas con *Pinus halepensis*; y por último, los valles aluviales, cultivados en su mayor parte con cereales y con algunas huertas, existiendo además retazos de bosque de ribera.

Todas son primeras citas para la provincia. Las coordenadas UTM se refieren todas a la zona 30T, y los pliegos sobre los que se basan nuestras citas se hallan depositados en el herbario MACB de la Facultad de Biología de la Universidad Complutense.

Bassia prostrata (L.) G. Beck

PALENCIA: Torquemada, en las cunetas de la carretera N-620, de Palencia a Burgos, UM5491, 23-IX-1987, M. A. Carrasco & A. Romero, MACB 26580.

Papaver somniferum L. subsp. **setigerum** (DC.) Arcangeli

PALENCIA: Caminos en el Monte de Astudillo, UM6492, 28-VI-1987, C. López & A. Romero, MACB 26602.

Relativamente frecuente como arvense en nuestra zona. Con esta localidad ampliamos la distribución dada por T. E. DÍAZ GONZÁLEZ (1986: 409).

Colutea atlantica Browicz

PALENCIA: San Cebrián de Buenamadre, VM 6800, 30-V-1987, C. López & A. Romero, MACB 26628.

Aparece acompañando a encinas sobre calizas. De este taxón hemos encontrado muy pocos testimonios en los herbarios consultados (MA, MAF y MACB) y pocas citas bibliográficas, aunque existe una de Fernández Alonso (1986: 162) para Valladolid, en hábitat similar. La nuestra es la localidad más septentrional de su área de distribución.

Anthriscus caucalis Bieb. var. **neglecta** (Boiss. & Reuter) P. Silva & Franco.

PALENCIA: Cordovilla la Real, UM5995, 7-V-1988, C. López & A. Romero, MACB 26589.

De este taxón, herborizado en los prados que bordean al río Pisuerga, no hemos encontrado citas bibliográficas anteriores, aunque se conserva un pliego palentino de F. de las Barras (MA 85293).

Globularia valentina Willk.

PALENCIA: Villamediana, UM6088, 21-V-1988, C. López, C. Monge & A. Romero, MACB 26587.

Frecuente en los prados de *Aphyllantion*, sobre margas yesosas. No conocemos citas anteriores en la provincia de este endemismo del NE de España, aunque existe un pliego de Fernández Alonso, de Castrillo de Don Juan (MA 349146). Nuestra aportación amplía hacia el Oeste su área de distribución.

Orobanche variegata Wallr.

PALENCIA: Villamediana, en margas yesosas, UM5987, 2-VI-1988, C. López & A. Romero, MACB 26581; páramo de Villamediana, UM6089, 17-VI-1988, C. López & A. Romero, MACB 26582.

Poco frecuente, aparece parasitando a leguminosas arbustivas. Existen muy pocas referencias de este taxón, siendo la más cercana que conocemos un pliego de Montes de Oca, en Burgos, de E. Fuentes (MACB 22696).

Galium elongatum C. Presl in J. & C. Presl

PALENCIA: Torquemada, bordes del río Pisuerga, UM5491, 16-VII-1987, C. López & A. Romero, MACB 26609.

Launea pumila (Cav.) O. Kuntze

PALENCIA: Fuentes de Nava, en prados, UM5855, 30-V-1987, C. López & A. Romero, MACB 26631.

Endemismo frecuente en la mitad oriental de la península, que aparece escaso en nuestra zona; nuestra cita es la más occidental conocida en la submeseta norte.

Hordeum marinum Hudson

PALENCIA: Fuentes de Nava, UM5855, 30-V-1987, López & A. Romero, MACB 26620.

Este taxón fue herborizado en los prados que ocupan la laguna desecada de La Nava. Aunque ha sido citada en inventarios por LADERO (1984:33), en zonas salinas del Sur de la provincia, nuestra localidad es la más septentrional de su área de distribución.

Poa trivialis L. subsp. *feratiana* (Boiss. & Reuter) A. M. Hernández

PALENCIA: Cordovilla la Real, en la umbria de una chopera, al borde del río Pisuerga, UM5995, 27-VI-1987, C. López & A. Romero, MACB, 26597.

Stipa pennata L. subsp. *eriocaulis* (Borbás) Martinovsky & Skalicky

PALENCIA: Valdeolmillos, quejigar en la Finca del Monte Polanco, UM5783, 13-VI-1987, C. López & A. Romero, MACB 26614; San Cebrían de Buenamadre, en encinares, VM6800, 27-VI-1987, C. López & A. Romero, MACB 26614.

Bastante frecuente en nuestra zona; sólo ha sido citado en la bibliografía del Noreste peninsular. Para la cuenca del Duero existen testimonios de Soria y Valladolid, depositados en el herbario del Jardín Botánico de Madrid (MA).

Ophrys arachnitiformis Gren. & Philippe

PALENCIA: Quintana del Puente, UM6299, 16-V-1987, C. López & A. Romero, MACB 26641.

Muy escaso, en claros de quejigar. No lo conocemos para la provincia, aunque ha sido citado de León (LAINZ 1973: 205) y GALÁN (1986: 72) recoge una cita de Frey en Burgos.

Ophrys scolopax Cav. subsp. **scolopax**

PALENCIA: Quintana del Puente, claros del encinar-quejigar, UM6299, 2-VI-1988, C. López & A. Romero, MACB 26585; Quintana del Puente, UM6199, 18-VI-1988, C. López & A. Romero, MACB 26584.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- DÍAZ GONZÁLEZ, T. E. 1986. *Papaver L.* In Castroviejo et al. (Eds.), *Flora iberica I*: 407-417. Madrid.
- FERNÁNDEZ ALONSO, J. L. 1986. *Phragmata chorologica occidentalia*, 306-392. *Anales Jard. Bot. Madrid*, 46 (2): 517-525.
- GALÁN, P. 1986. Datos previos para un catálogo de las orquídeas burgalesas. *Anales Jard. Bot. Madrid*, 43 (1): 65-82.
- LADERO, M., NAVARRO, F., VALLE, C. J., MARCOS, B., RUIZ, T. & SANTOS, M. T. 1984. Vegetación de los saladares castellano-leoneses. *Studia Botanica*, 3:17-62.
- LAINZ, M. 1973. Aportaciones al conocimiento de la flora cántabro-astur X. *Bol. Inst. Estud. Asturianos, Ser. C.*, 16: 159-206.

Aceptado para su publicación: 30-V-1989.