

Volume Contents

Research Papers:

- Environmental parameters of a coral assemblage from the Akerchi Formation (Carboniferous), Adarouch Area, central Morocco
Parámetros ambientales de una asociación de corales de la Formación Akerchi (Carbonífero), Área de Adarouch, Marruecos central
I. Said, S. Rodríguez, M. Berkhli, P. Cózar, A. Gómez-Herguedas 7
- Recent tectonic and morphostructural evolution of Byers Peninsula (Antarctica): insight into the development of the South Shetland Islands and Bransfield Basin
Evolución tectónica y morfoestructural reciente de la Península de Byers (Antártida): evidencias sobre el desarrollo de las Islas Shetland del Sur y la Cuenca de Bransfield
P. Alfaro, J. López-Martínez, A. Maestro, J. Galindo-Zaldívar, J.J. Durán-Valsero, J.A. Cuchí 21
- Monthly and seasonal variation in beach profile along the coast of Tiruchendur y Kanyakumari, Tamilnadu, India
Variaciones mensuales y estacionales del perfil de playa en la costa de Tiruchendur and Kanyakumari, Tamilnadu, India
S. Saravanan, N. Chandrasekar 39
- Taphonomic analysis of fossil concentrations from La Manga Formation (Oxfordian), Neuquén Basin, Mendoza Province, Argentina
Análisis tafonómico de las concentraciones fósiles de la Formación La Manga (Oxfordiano), Cuenca Neuquina, Provincia de Mendoza, Argentina
G.S. Bressan, R.M. Palma 55
- Some considerations on the initiation of the present SE Ebro river drainage system: Post- or pre-Messinian?
Algunas reflexiones sobre el inicio del sistema de drenaje actual del SE del río Ebro: ¿pre- o post-Messiniense?
A. Arche, G. Evans, E. Clavell 73
- Sand provenance and implications for paleodrainage in a rifted basin: the Tera Group (N. Spain)
Procedencia de areniscas e implicaciones en el paleodrenaje de una cuenca de rift: el Grupo Tera (N. España)
L. González-Acebrón, J. Arribas, R. Mas 87