

## COMUNICACIONES

### De nomenclatura notulae, I

Salvador Rivas-Martínez (\*)

**Resumen:** Rivas-Martínez, S. *De nomenclatura notulae, I. Lazaroa, 2: 327-328 (1980).*  
Notas nomenclaturales sobre flora española.

**Abstract:** Rivas-Martínez, S. *De nomenclatura notulae, I. Lazaroa, 2: 327-328 (1980).*  
Nomenclatural notes on Spanish Flora. (In spanish).

A través de esta serie de pequeñas comunicaciones queremos dar a conocer o legitimar algunos nombres o combinaciones que se consideran adecuados para designar táxones específicos o infraespecíficos.

1. *Asplenium nevadensis* (Salvo) Rivas-Martínez *comb. nova* = *Pleurosorus nevadensis* Salvo, *Lazaroa* 1: 177. 1979.

Si *Asplenium* L. incluye *Pleurosorum* Fee (v. Lovis in *Bot. Jour. Linn. Soc.* 67: 211-228, 1973), a él se deben llevar las dos especies españolas del género: *Pleurosorus hispanicus* (Cosson) C.V. Morton, *Bull. Soc. Bot. Fr.* 106: 233. 1959 = *Grammitis hispanica* Cosson, *Not. Pl. Crit.* 2: 48. 1849, recientemente combinado por Greuter & Burdet (*Willdenowia* 10: 17. 1980) y *Pleurosorus nevadensis* Salvo, *Lazaroa* 1: 177. 1979 descrito del Barranco de Maitena, (Sierra Nevada, Granada).

2. *Isoetes velata* A. Braun subsp. *asturicense* (Lainz) Rivas-Martínez & Prada *comb. nova* = *Isoetes boryanum* Dur. subsp. *asturicense* Lainz, *Bol. Inst. Est. Asturianos (Supl. ci)* 15: 6. 1970 = *Isoetes asturicensis* (Lainz) Lainz, *An. Soc. Broteriana* 39: 118. 1973.

El velo y la morfología de las macrósporas y micrósporas nos mueve a considerar este taxon bejarano-leonés como subespecie del *Isoetes velata* A. Braun in Bory & Durieu, *Expl. Sci. Algér. Bot.* 1: 39. 1850.

3. *Arenaria grandiflora* L. subsp. *incrassata* (Lange) C. Vicioso *stat. nov.* = *Arenaria incrassata* Lange, *Descr. Icon.* III, 1: 3, tb. 4. 1864 = *Arenaria grandiflora* L. subsp. *incrassata* (Lange) C. Vicioso, *Anal. Jardín Bot. Madrid* 6 (2): 29. 1946, *comb. inval.*

Legitimamos aquí, citando el basónimo, lo que propuso C. Vicioso para el pequeño taxon de semillas granulosas, sépalos trinerviados y tallos de sección subcuadrangular.

(\*) Departamento de Botánica, Facultad de Farmacia, Universidad Complutense, Madrid.

4. *Arenaria tetraquetra* L. subsp. *cavanillesiana* (Font Quer & Rivas Goday) Rivas-Martínez *stat. nov.* = *Arenaria aggregata* subsp. *erinacea* var. *cavanillesiana* Font Quer & Rivas Goday in Font Quer, Anal. Jardín Bot. Madrid 6 (2): 487. 1946.

Este endemismo manchego de tallos alargados, dorso de las brácteas y hojas velloso-tomentosas y glómérulos paucifloros, es acreedor del rango subespecífico.

5. *Agrostis delicatula* Pourret ex Lapeyr. subsp. *durieui* (Boiss. & Reuter ex Willk.) *stat. nov.* = *Agrostis durieui* Boiss. & Reuter ex Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hisp. 15. 1893. Este taxon sustituye a la subsp. *delicatula* en el norte y noroeste de la Península Ibérica. La ligula tan larga como ancha, en vez de más larga que ancha, así como las medidas fluctuantes de espiguillas y lemas parecen aconsejar el rango subespecífico para *A. durieui* Boiss. & Reuter ex Willk., a pesar de la reciente opinión de T.G. Tutin (Fl. Europ. 5: 234. 1980).

6. *Centaurea tentudaica* (Rivas Goday) Rivas Goday & Rivas-Martínez *stat. nov.* = *Centaurea toletana* subsp. *tentudaica*, Veg. Fl. Cuenca Extr. Guadiana 666. 1963.

Por sus grandes capítulos solitarios, segmentos foliares espinescentes, flores rosado-es-tramineas y aquenios mayores, difiere netamente este taxon Araceno-pacense del también silicícola *Centaurea toletana* Boiss. & Reuter, Diag. Pl. Nov. Hisp. 18. 1842. Opinamos de modo diferente a Dostal (Flora Europ. 4: 269. 1976) respecto al taxon calcícola manchego (alcanza el Calar del Mundo) de flores amarillas *Centaurea cavanillesiana* Graells, Ramilletes de plantas españolas, 1: 6. 1859, ya que le consideramos tan buena especie como el endemismo manchego *Centaurea argecillensis* Gredilla, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 3: 431. 1903, que prefiere los sustratos margosos.

7. *Omalothea sylvatica* (L.) Schultz Bipontinus subsp. *carpetana* (Willk.) *comb. nov.* = *Gnaphalium sylvaticum* L. var. *carpetanum* Willk., in Willk. & Lange Prodr. Fl. Hisp. 2: 62. 1865 = *Gnaphalium carpetanum* Boiss. & Reuter ined. ap. Willk. (l.c.) = *Gnaphalium sylvaticum* subsp. *carpetanum* (Willk.) Rivas-Martínez, Anal. Inst. Bot. Cavanilles, 21 (1): 272. 1963, *comb. inval.*

Este taxon carpetano de inflorescencias y talla menores que el tipo, brácteas del capítulo verdosas y hojas lanuginosas en el haz, merece el rango subespecífico que ya le adjudicamos (1963).