

Táxones de las comarcas de Tamajón y Valdepeñas de la Sierra (Guadalajara, España)

V. de la Fuente (*)

Resumen: Fuente, V. de la. *Táxones de las comarcas de Tamajón y Valdepeñas de la Sierra (Guadalajara, España)*. *Lazaroa*, 3: 359-361 (1981).

Se estudian algunos táxones de las comarcas de Tamajón y Valdepeñas de la Sierra que presentan cierto interés ecológico o corológico.

Abstract: Fuente, V. de la. *Taxa from Tamajón and Valdepeñas de la Sierra (Guadalajara, Spain)*. *Lazaroa*, 3: 359-361 (1981).

Some taxa from the Tamajón-Valdepeñas de la Sierra (Guadalajara) area of ecological and chorological interest are briefly commented.

Con motivo de la realización de nuestra tesis doctoral sobre la flora y vegetación de las comarcas de Tamajón y Valdepeñas de la Sierra hemos hallado un buen número de táxones críticos, poco conocidos, que presentan interés ecológico o corológico, algunos de los cuales damos a conocer en la presente nota. Las comarcas que estudiamos se hallan ubicadas en los sectores corológicos Guadarrámico y Celtibérico-alcarreño de las provincias (Carpetano-ibérico-leonesa) y (Castellano-maestrazgo-manchega) respectivamente.

Arenaria aggregata (L.) Loisel. subsp. **erinacea** (Boiss.) Font-Quer var. **microphylla** (Pau) Font Quer, *Arx. Secc. Ci. Inst. Est. Catalans* 15: 35. 1948.

Hallada junto a *Erinacea anthyllis* Link y *Festuca indigesta* Boiss. subsp. *aragonensis* (Willk.) Kerguelen, sobre sustratos calcáreos, en biótijos venteados. Parece que alcanza nuestro territorio a través de las vías migratorias bético-maestracenses. Ermita de los Enebrales, Tamajón.

Buglossoides purpurocaerulea (L.) I.M. Johnston, *Jour. Arnold Arb.* 35: 44. 1954.

Relativamente abundante en los quejigares húmedos con avellanos (*Cephalanthero-Quer-*

(*) Departamento de Botánica, Facultad de Ciencias, División de Biología, Universidad Autónoma, Madrid-33.

cetum fagineae coryletosum) de las riberas del Jarama cerca del convento de Bonabal, Retiendas (Guadalajara).

Cytisus striatus (Hill) Rothm., subsp. **eriocarpus** (Boiss. & Reuter) Rivas-Martínez, Anal. Inst. Bot. Cavanilles, 34 (2): 540. 1978.

Este piorno mediterráneo ibero-atlántico era común en el piso mesomediterráneo seco, en las solanas del Arroyo de Robledillo, cerca de Alpedrete de la Sierra. Vivía sobre suelos silíceos limo-arcillosos, en compañía de *Retama sphaerocarpa* (L.) Boiss., *Cistus ladanifer* L., etc. (*Retamion, Cytisetea scopario-striati*).

Centaureum erythraea Rafn. subsp. **grandiflorum** (Biv.) Helderis, Bot. Jour. Linn. Soc. 65: 234. 1972.

En los prados húmedos y umbrosos de Arroyo del Pueblo, Retiendas (Guadalajara), se halla este taxon de tallo ramificado tanto en la base como en la parte superior.

Chaenorrhinum robustum Loscos, Tract. Pl. Arag. 1: 14. 1876.

Hallado en los tomillares de solana de Cuerda Gallinera, Valdesotos (Guadalajara).

Delphinium gracile DC., Reg. Veg. Syst. Nat. 1: 350. 1817.

Taxon polimorfo, del que se conocen pocas citas en la Península Ibérica. Herborizado en el Pontón de la Oliva (Madrid).

Hymenolobus pauciflorus (Koch) Schinz & Thell., Viert. Naturf. Gess. Zurich. 66: 285. 1921.

Especie abundante en las comunidades de terófitos efímeros de las cuevas y cornisas calcáreas eutrofizadas de Retiendas (Guadalajara).

Minuartia dichotoma L., Sp. Pl. 89. 1753.

Como pionero en los tomillares poco densos, desarrollados sobre litosuelos arenosos de pizarras (*Corynephorion-radicatae*); Tortuero (Guadalajara).

Moehringia intricata Willk., Linnaea 25: 14. 1852.

Casmófito frecuente con *Sarcocapnos enneaphylla* DC. en los cinglos calcáreos de Retiendas (Guadalajara).

Ononis rotundifolia L., Sp. Pl. 719. 1753.

Hallado como pionero sobre molasas en las cercanías de Valdesotos (Guadalajara).

Pedicularis sylvatica L. subsp. **lusitanica** (Hoffmanns. & Link) Coutinho, Fl. Port. 565. 1913.

En los prados higrófilos oligótrofos, adyacentes a las alisedas de Arroyo Concha, Tortuero (Guadalajara).

Polygala exilis DC., Cat. Pl. Horti Monsp. 133. 1813.

Terófito herborizado en los claros de los tomillares calcícolas de la Ermita de los Enebrales, Tamajón (Guadalajara).

Primula veris L., subsp. **canescens** (Opiz) Hayek ex Ludi in Hegi, Ill. Fl. Mitteleur. 5 (3): 1752. 1927.

En los quejigares basífilos de las umbrías de Retiendas (*Cephalanthero-Quercetum fagineae*) hallamos este taxon en compañía de *Primula veris* L. y *Primula veris* f. *columnae* (Ten.) Ludi.

Silene italica (L.) Pers. subsp. **nemoralis** (Waldst. & Kit.) Nyman, Consp. 90. 1878.

Las uñas de los pétalos glabros la separan de la subsp. *italica*. Herborizada en los melojares del Arroyo de Matalasyeguas. Pantano del Vado.

Viola willkommii R. de Roemer, Linnaea 25: 10. 1852.

Hallada en los quejigares supramediterráneos de Retiendas (*Cephalanthero-Quercetum fagineae*), lo que confirma lo expuesto por Rivas-Martínez (Anal. Inst. Bot. Cavanilles, 36: 307. 1980).