

Notas florísticas de Gredos occidental (Sistema Central, España)

Santiago Sardinero (*)

Resumen: Sardinero, S. *Notas florísticas de Gredos occidental (Sistema Central, España)*. *Lazaroa 16: 193-196 (1996)*.

Se citan algunas plantas con interés corológico herborizadas en el macizo occidental de la Sierra de Gredos.

Abstract: Sardinero, S. *Floristical notes from Western Sierra de Gredos (Spanish Central System)*. *Lazaroa 16: 193-196 (1996)*.

Several records of vascular plants from Western Sierra de Gredos with chorological interest are commented.

***Alyssum minutum* DC.**

Cáceres: Tornavacas, entre el pueblo y el puerto, 30TTK7160, 960 m, 25-IV-1992, *Sardinero*, MAF 143812.

Primera cita provincial.

***Baldellia alpestris* (Cosson) Lainz**

Ávila: Gilgarcía, Aravalle, 30TTK7965, 1080 m, 14-VIII-1993, en biótopos temporalmente inundados. *Sardinero*, MAF 143822.

Primera cita provincial y para el Sistema Central Ibérico.

***Barbarea intermedia* Boreau**

Ávila: Aravalle, Puerto Castilla, 30TTK8168, 1050 m, 22-V-1992, *Sisymbrietalia* en borde húmedo de una aliseda. *Sardinero*, MAF 143818.

Primera cita provincial.

(*) Departamento de Biología Vegetal II. Facultad de Farmacia. Universidad Complutense. 28040 Madrid. España.

Cleome violacea L.

Salamanca: Sierra de Béjar, Candelario, 30TTK675699, 1520 m, 22-VIII-1992, suelo removido, *Sardinero*, MAF 143810.

Única localidad del territorio donde hemos herborizado esta planta. El material correspondiente a las localidades más próximas que hemos consultado es el siguiente: **Cáceres:** Serradilla, 29SQE41, 1899, *Rivas Mateos*, MAF 17172; Carrascalejo de la Jara, 30SUJ1109, 650 m, 6-VIII-1981, *Ladero*, MAF 124508; ibídem: 12-VII-1968, barbecho del arroyo de la Parada, *Ladero*, MAF 71385; ibídem: 20-VII-1968, *Ladero*, MAF 80439; ibídem: 6-VIII-1969, *Ladero*, MAF 78236; ibídem: 21-IX-1969, *Ladero*, MAF 74119; Torrejón el Rubio, 29SQE50, arroyo de la Vid, 25-IV-1980, *D. Belmonte*, MAF 116487. **Salamanca:** La Fregeneda, muelle de Vegate-rón, 29TPF7544, 150 m, 27-V-1982, olivares no roturados, *Amich*, MAF 130487.

Consolida ajacis (L.) Schur

Ávila: Tremedal, Los Loros, 30TTK792695, 1280 m, 12-VII-1992, *Ruderali-Secalietaea*, *Sardinero*, MAF 143811.

Primera cita provincial. La hemos visto cultivada en Becedas, Piedrahíta, Solana de vila y Los Loros; naturalizada la hemos observado en la localidad reseñada.

Eriophorum latifolium Hoppe

Ávila: Gilgarcía, Aravalle, 30TTK7965, 1080 m, 14-VIII-1993. *Sedo lagascae-Eriophoretum latifolii*, *Sardinero*, MAF 143814.

Única localidad del territorio donde hemos localizado esta planta.

Eryngium galioides Lam.

Salamanca: El Tejado, 30TTK8478, 990 m, 4-VI-1992, depresiones húmedas, *Sardinero*, MAF 143809.

Única localidad del territorio donde hemos localizado esta planta.

Euphorbia angulata Jacq.

Ávila: Tremedal, 30TTK775704, 1510 m, 17-VII-1991, *Vicio sepium-Centaureetum carpetanae*, *Sardinero*, MAF 143820.

Las citas más cercanas que conocemos proceden de Madrid: Valle del Paular (FERNÁNDEZ-GONZÁLEZ, Tesis Doct. inéd.: 120. 1988), y de Zamora: Sierra Calva de Porto, Puebla de Sanabria, 19-VII-1973, *B. Casaseca*, MA 196337 (SIMÓN, MOLERO & BLANCHÉ, Collect. Bot. (Barcelona) 21: 213. 1992).

Euphorbia nevadensis Boiss. & Reuter subsp. *nevadensis*

Ávila: Navalguijo, garganta de los Caballeros, 30TTK8658, 1300 m, 27-IX-1993, claros de brezales de *Erica arborea*, *Sardinero*, MAF 143821.

En el territorio es muy abundante *Euphorbia broteri* Daveau; sólo hemos localizado *E. nevadensis* subsp. *nevadensis* en la localidad indicada. Sumada a las localidades del Sistema Central citadas por MOLERO & RÓVIRA (Collect. Bot. (Barcelona) 21: 167. 1992), la aquí aportada resulta ser la más occidental.

Halimium ocymoides (Lam.) Willk. in Willk. & Lange

Ávila: Puerto Castilla, puerto de Tornavacas, 30TTK7461, 1275 m, 21-VI-1991, cantuesales, *Sardinero*, MAF 136026, MAF 136028, MAF 136029; Navalguijo, 30TTK8660, 1180 m, 28-VII-1993, escasísimo, en cantuesales, *Sardinero*, MAF 143813. **Cáceres:** Tornavacas, entre el puerto y el pueblo, 30TTK7361, 1150 m, 22-VI-1991, cantuesales, *Sardinero*, MAF 136027; Alto valle del Jerte, Cabezueta del Valle, subida al puerto de Honduras, 30TTK6255, 800 m, 31-VII-1991, cantuesales, *Sardinero*, MAF 136030; ibídem: 950 m, 31-VII-1991, cantuesales con *Festuca elegans*, *Sardinero*, MAF 136031; Sierra de Tormantos, Píornal, 30TTK6045, 1300 m, Pico del Puerto, 16-VI-1989, *Sardinero*, MAF 136032.

Planta frecuente en los jaral-brezales de las laderas meridionales gredenses; el puerto de Tornavacas supone una barrera que difícilmente logra superar; en la cara norte de la Sierra únicamente la hemos hallado —y ciertamente escasa— en Navalguijo.

Juniperus communis* subsp. *hemisphaerica (K. Presl) Nyman

Ávila: Navalperal de Tormes, final de la Garganta de las Pozas, 30TUK0569, 1260 m, 25-VII-1993, *Sardinero*, MAF 143815.

Única localidad del territorio de donde conocemos este enebro.

***Osmunda regalis* L.**

Ávila: Umbrias, Aravalle, presa de la Retuerta, puente de la presa, 30TTK8067, 1070 m, 12-VIII-1993, aliseda, *Sardinero & Sánchez Gamboa*, MAF 143816.

Pteridófito frecuente en las alisedas de las vertientes meridionales gredenses; la localidad indicada es la única de la vertiente norte de la Sierra donde lo hemos hallado. Constituye otro ejemplo en el cual el puerto de Tornavacas representa una barrera prácticamente insuperable para algunos táxones abundantes en la vertiente meridional.

***Polygala microphylla* L.**

Cáceres: Alto Jerte, Tornavacas, 30TTK726613, 1200 m, I-V-1993, suelos decapitados, *Sardinero & Sánchez Gamboa*, MAF 143808.

Un ejemplo más de planta que no logra traspasar hacia el norte el puerto de Tornavacas.

***Rubus castellarnau* Pau**

Ávila: Navalanguilla, 30TTK8760, 1160 m, 29-VIII-1992, abedular, *Sardinero*, MAF 143827, MAF 143828; Tormellas, 30TTK8665, 1060 m, 29-VIII-1992, garganta de los Caballeros, aliseda, *Sardinero*, MAF 143829. **Cáceres:** Sierra de Béjar, La Garganta, 30TTK6167, 1260 m, 2-IX-1992, *Sardinero*, MAF 143825. **Salamanca:** Navacarros, 30TTK6974, 1185 m, 2-IX-1992, arroyo Carabias, *Sardinero*, MAF 143824; Sierra de Béjar, Candelario, 30TTK6769, 1580 m, 2-IX-1992, *Sardinero*, MAF 143826, MAF 143823.

Primeras citas para las provincias de Ávila, Cáceres y Salamanca.

***Rubus henriquesii* Samp.**

Cáceres: Tornavacas, Valle del Jerte, arroyo Calbarrasa, 30TTK7059, 830 m, 31-VIII-1992, aliseda, *Sardinero*, MAF 143832, MAF 143833.

Primera cita provincial. Lo hemos observado únicamente en las alisedas del alto Jerte. Pudiera ser que tampoco traspasara el puerto de Tornavacas en dirección norte.

***Rubus radula* Weihe ex Boenn.**

= *Rubus koehleri* var. *gredensis* Pau

Ávila: Solana de Ávila, central del Chorro, 30TTK7265, 1410 m, 27-VIII-1992, *Sardinero*, MAF 143837. **Cáceres:** Sierra de Tormantos, Piornal, 30TTK5945, 1290 m, I-IX-1992, en depresiones húmedas, *Sardinero*, MAF 143836; Sierra de Béjar, La Garganta, 30TTK6267, 1440 m, 31-VIII-1992, espinales en vaguada, *Sardinero*, MAF 143839. **Salamanca:** Sierra de Béjar, Candelario, 30TTK6769, 1610 m, 2-IX-1992, depresiones húmedas, *Sardinero*, MAF 143835; Sierra de Béjar, Navacarros, 30TTK6974, 1200 m, 2-IX-1992, arroyo Carabias, aliseda, *Sardinero*, MAF 143838.

MONASTERIO-HUELLIN (Tesis Doct. inéd.: 79, 1992) lo citó de la Sierra del Barco (MA 55058), en la provincia de Ávila. Aportamos ahora una cita de la vertiente abulense de la Sierra de Béjar, más varias que suponen primeras citas provinciales para Cáceres y Salamanca.

***Rubus vagabundus* Samp.**

Ávila: Puerto Castilla, arroyo Regueros, 30TTK7462, 1210 m, 31-VII-1993, aliseda, *Sardinero*, MAF 143844; Solana de Ávila-Santiago de Aravalle, reguero de Santiago, 30TTK7765, 1130 m,

31-VII-1993, *Sardinero*, MAF 143845; Tormellas, garganta de los Caballeros, aliseda, 30TTK8665, 1050 m, 29-VIII-1992, *Sardinero*, MAF 143843; Navalonguilla, 30TTK8760, 1160 m, 29-VIII-1992, abedular, *Sardinero*, MAF 143846; ibidem: 3-VIII-1993, *Sardinero*, MAF 143842; San Bartolomé de Tormes, cruce del puerto de la Peña Negra, 30TUK0770, 1300 m, 25-VIII-1993, aliseda, *Sardinero*, MAF 143841.

MONASTERIO-HUELIN (Tesis Doct. inéd.: 84. 1992), lo cita de Avila, Casillas, en la vertiente sur de la Sierra de Gredos. Aportamos ahora nuevas citas de esta zarza en la vertiente norte.

***Sisymbrium austriacum* subsp. *chrysanthum* (Jord.) Rouy & Foucad**

Cáceres: Sierra de Tormantos, Tornavacas, garganta de San Martín, 30TTK7657, 1635 m, 11-IX-1992, *Sardinero*, MAF 143817.

Primera cita provincial.

En la Sierra de Béjar [**Salamanca:** Candelario, 30TTK6769, 1760 m, 29-VII-1991, taludes del borde de la carretera, *Sardinero*, MAF] hemos hallado plantas anuales glabras en la base del tallo, con silicuas de diámetro igual o mayor a 1 mm y longitud menor de 3 cm, que interpretamos como las formas intermedias entre las subespecies *chrysanthum* y *contortum* a las que se refiere PUJADAS SALVÁ (in CASTROVIEJO & al. (eds.), *Flora Iberica* 4: 14-16. 1993). La subespecie *contortum* se encuentra ampliamente distribuida por los piedemontes de la Sierra.

***Vaccinium myrtillus* L.**

Ávila: Navalonguilla, 30TTK8760, 1170 m, 3-VIII-1993, entre *Betula celtiberica*, *Alnus glutinosa* y *Quercus pyrenaica*, Ferrero & *Sardinero*, MAF 143819.

Única localidad del territorio de donde conocemos esta planta.

Agradecemos a la Dra. Elena Monasterio-Huelin la revisión del material de *Rubus*.