

Novedades para el catálogo de la flora de Burgos

Javier María García López, Carmen Allué Camacho
& Miguel Ángel Pinto Cebrián (*)

Resumen: García López, J.M., Allué Camacho, C. & Pinto Cebrián, M.A. *Novedades para el catálogo de la flora de Burgos. Lazaroa 21: 161-163 (2001).*

Se presentan datos corológicos correspondientes a ocho nuevos taxones para el Catálogo de la flora de Burgos (*Asparagus acutifolius* L., *Astragalus alopecuroides* L., *Astragalus glaux* L., *Bellardia trixago* (L.) All., *Coronilla juncea* L., *Lepidium subulatum* L., *Moricandia moricandioides* (Boiss.) Heywood y *Reseda stricta* Pers.).

Abstract: García López, J.M., Allué Camacho, C. & Pinto Cebrián, M.A. *New records for the floristic checklist of Burgos province (Spain). Lazaroa 21: 161-163 (2001).*

Chronological distributions for eight new taxa are presented for the Check-list of Flora of Burgos Province (Spain) (*Asparagus acutifolius* L., *Astragalus alopecuroides* L., *Astragalus glaux* L., *Bellardia trixago* (L.) All., *Coronilla juncea* L., *Lepidium subulatum* L., *Moricandia moricandioides* (Boiss.) Heywood and *Reseda stricta* Pers.).

Las referencias que se incluyen a continuación, correspondientes a primeras citas provinciales de varios taxones para la provincia de Burgos, incluyen las coordenadas de la cuadrícula U.T.M. de 1 × 1 km de localización, así como información varia sobre paraje, altitud y litología. En todos los casos el subtipo fitoclimático es el VI(IV)₁ de ALLUE-ANDRADE (Atlas Fitoclimático de España. 1990) salvo en el caso de la primera de ellas, que corresponde al IV(IV)₁ del mismo autor. Se incluyen asimismo mapas de localización provincial en cuadrícula U.T.M. de 10 × 10 km.

Asparagus acutifolius L.

Burgos: 30TVM2108, Nava de Roa, Monte de Utilidad Pública 606, sustrato arenoso, 800 m, entorno de pinar y encinar de *Pinus pinaster* y *Quercus ballota*.

No conocemos referencias provinciales previas.

Astragalus alopecuroides L. subsp. **alopecuroides**

Burgos: 30TVM0383, Castrojeriz, laderas margosas desarboladas, 825 m.

Taxón que no se cita para Burgos en PODLECH (in CASTROVIEJO & al. (eds.), *Flora Iberica* 7(1): 303. 1999), quien sin embargo da segura su presencia en las vecinas provincias de Logroño, Palencia, Segovia, Soria y Valladolid.

Astragalus glaux L.

Burgos: 30TVM2176, entre Pampliega y Torrepadierno, laderas calizas y margosas, 825 m, entorno de *Quercus faginea* en monte bajo; 30TVM0383, Castrojeriz, laderas margosas desarboladas, 825 m.

Esta especie no se cita para Burgos en PODLECH (in CASTROVIEJO & al. (eds.), *Flora Iberica* 7(1): 303. 1999), quien sin em-

bargo da segura su presencia en las vecinas provincias de Logroño, Palencia, Segovia, Soria y Valladolid.

Bellardia trixago (L.) All.

Burgos: 30TVM0767, Revilla-Vallejera, enclaves rezumantes de agua en laderas yesosas desarboladas, 800 m; 30TVM0383, Castrojeriz, prados húmedos al pie de laderas margosas desarboladas, 825 m; 30TVM1364, entre Valles de Palenzuela y Santa María del Campo, laderas yesosas, 850 m.

No conocemos referencias provinciales previas.

Coronilla juncea L.

Burgos: 30TVM1577, Villaquirán de los Infantes, laderas calizas y margosas, 850 m, entorno de *Quercus faginea* en monte bajo; 30TVM2176, entre Pampliega y Torrepadierno, laderas calizas y margosas, 825 m, entorno de *Quercus faginea* en monte bajo; 30TVM6159, Mambriellas de Lara, monte de Utilidad Pública 236, suelos calizos descarboxinados, 1050 m, entorno de *Quercus faginea* con *Cistus laurifolius*; 30TVM1364, entre Valles de Palenzuela y Santa María del Campo, pastos húmedos al pie de laderas yesosas, 850 m.

No conocemos referencias provinciales previas.

Lepidium subulatum L.

Burgos: 30TVM2176, entre Pampliega y Torrepadierno, laderas calizas y margosas, 825 m, entorno de *Quercus faginea* en monte bajo; 30TVM1364, entre Valles de Palenzuela y Santa María del Campo, laderas yesosas, 850 m.

No se cita para la provincia en CASTROVIEJO & al. (1986-1999). Tampoco se cita para Burgos en HERNANDEZ BERMEJO &

* Unidad del Medio Natural. Servicio Territorial de Medio Ambiente. Junta de Castilla y León. Juan de Padilla s/n. 09071-Burgos. Tf: 947-28.15.57. FAX: 947-28.15.56. E-mail: javier-maria.garcia@bu.jcyl.es.

CLEMENTE (in CASTROVIEJO & al. (eds.), *Flora Iberica* 4: 321. 1993), quien sin embargo da segura su presencia en las vecinas provincias de Palencia, Valladolid y Soria, y dudosa en Segovia.

Moricandia moricandioides (Boiss.) Heywood subsp. **moriciandioides**

Burgos; 30TVM1364, Entre Valles de Palenzuela y Santa María del Campo, Laderas yesosas, 850 m.


Taxón que no se cita para Burgos en SOBRINO (in CASTROVIEJO & al. (eds.), *Flora Iberica* 4: 341. 1993), quien sin embar-

go da segura su presencia en las vecinas provincias de Palencia y Logroño.


Reseda stricta Pers. subsp. **stricta**

Burgos; 30TVM1364, entre Valles de Palenzuela y Santa María del Campo, laderas yesosas, 850 m; 30TVM2051. Royuela de Río Franco, laderas calizas, 850 m.


Taxón que no se cita para Burgos en AEDO & MUÑOZ GARMENDIA (in CASTROVIEJO & al. (eds.), *Flora Iberica* 4: 466. 1993), quien sin embargo da segura su presencia en la vecina provincia de Valladolid y dudosa en la de Palencia




Asparagus acutifolius L.




Astragalus alupecurioides L.




Astragalus glaux L.




Bellardia trixago (L.) All.




Coronilla juncea L.



Lepidium subulatum L.



Moricandia moricandioides (Boiss.) Heywood



Reseda stricta Pers.

