

Algunos líquenes interesantes del Levante peninsular

A. Crespo (*) & V. Atienza (**)

Resumen: Crespo, A. & Atienza, V. *Algunos líquenes interesantes del Levante peninsular. Lazaroa, 3: 371-373 (1981).*

Se citan algunos táxones liquénicos de la provincia de Valencia nuevos o interesantes para la flora española: *Arthothelium crozalsianum*, *A. spectabile*, *Bacidia beckhausii*, *Caloplaca pollinii*, *C. suberytraella*, *Catillaria nigroclavata*, *Lecidea erythrophaca*, *Micarea peliocarpa*, *Microglaena modesta*, *Pachyphiale cornea*, *Parmelia acetabulum*, *Phaeophyscia hirsuta*, *Schismatomma picconianum*.

Abstract: Crespo, A. & Atienza, V. *Some interesting lichenic taxa from Valencia country. Lazaroa, 3: 371-373 (1981).*

Some new or interesting lichenic taxa for the spanish Flore from the Valencia country are cited: *Arthothelium crozalsianum*, *A. spectabile*, *Bacidia beckhausii*, *Caloplaca pollinii*, *C. suberytraella*, *Catillaria nigroclavata*, *Lecidea erythrophaca*, *Micarea peliocarpa*, *Microglaena modesta*, *Pachyphiale cornea*, *Parmelia acetabulum*, *Phaeophyscia hirsuta*, *Schismatomma picconianum*.

Se citan algunos táxones liquénicos, epífitos en su totalidad, desconocidos o interesantes para la flora española. Los testimonios se conservan en MAF-lich, y en el de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Valencia. Se adopta la nomenclatura de HAWKSWORTH, JAMES & COPPINS en The Lichenologist, 12(1): 1-115 (1980) u OZENDA & CLAUZADE en Les Lichens (1970) y POELT & VEZDA en Bestimmungsschlüssel europäischer Flechten (1977) para los táxones no comprendidos en el catálogo británico.

***Arthothelium crozalsianum* B. de Lesd.**

VALENCIA: Carcaixent, Font de la Parra (50 m). Sobre *Ceratonia siliqua* L. Raro. No conocemos citas españolas anteriores.

(*) Departamento de Botánica, Facultad de Farmacia, Universidad Complutense.

(**) Departamento de Botánica, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad de Valencia.

Arthothelium taediosum (Nyl.) Müll. Arg.

VALENCIA: Carcaixent, Font de la Parra (50 m) y Alzira, Font del Pelegrí (50 m). Sobre *Ceratonia siliqua* L. Abundante. No conocemos citas españolas anteriores.

Bacidia beckhausii Körber

VALENCIA: Carcaixent, Font de la Parra (50 m). Sobre *Pinus halepensis* Miller. Abundante. No conocemos citas españolas anteriores.

Caloplaca pollinii (Massal.) Jatta.

VALENCIA: Carcaixent, Font de la Parra (50 m.). Sobre *Ceratonia siliqua* L. Abundante. Citada en Pontevedra (SAMPAIO & CRESPI, Bol. Soc. Esp. Ha. Nat., 27: 143. 1927) y también en Portugal (COUTINHO, Catal. Lich. Lusit. Suppl. 1: 30. 1917).

Caloplaca suberytraella (Nyl.) Clauzade & Rondon

VALENCIA: Buñol, Collado Umán (450 m), Siete Aguas (850 m). Sobre *Aesculus hippocastanum* L. y *Quercus coccifera* L. Abundante. Bajo este nombre sólo conocemos citas del Pirineo oriental francés. Este taxon debe probablemente subordinarse a *C. ferruginea* (Huds.) Th. Fr. (HAWKSWORTH, JAMES & COPPINS, The Lichenologist, 12 (1): 22. 1980).

Catillaria nigroclavata (Nyl.) Schuler

VALENCIA: Segart (450 m); Carcaixent, Font de la Parra (50 m); Buñol, Collado Umán (450 m). Sobre *Ceratonia siliqua* L., *Quercus coccifera* L. y *Aesculus hippocastanum* L. Abundante. No conocemos citas españolas anteriores, pero sí una portuguesa de SAMPAIO (Broteria, ser. Bot. 19: 25. 1921).

Lecidea erythrophaca Flörke

VALENCIA: Buñol, Collado Umán (450 m). Sobre *Aesculus hippocastanum* L. Rara. No conocemos citas españolas anteriores.

Micarea peliocarpa (Anzi) Coppins & R. Sant.

VALENCIA: Buñol, Collado Umán (450 m). Sobre *Aesculus hippocastanum* L. Abundante. Citada en España (Teruel) por CRESPO & al. (Anales Jard. Bot. Madrid 36: 49. 1980) como *M. violacea* (Crouan ex Nyl.) Hedl.

Microglaena modesta (Nyl.) A. L. Sm.

VALENCIA: Buñol, Collado Umán (450 m). Sobre *Aesculus hippocastanum* L. Frecuente. Citada en España (Teruel) por CRESPO & al. (o. c.).

Pachyphiale cornea (With.) Poetsch.

VALENCIA: Buñol, Collado Umán (450 m). Sobre *Aesculus hippocastanum* L. Rara. Citada en España por SAMPAIO & CRESPI (o. c.) de Pontevedra.

Parmelia acetabulum (Necker) Duby.

VALENCIA: Buñol, Collado Umán (450 m). Sobre *Pinus halepensis* Miller. Estéril y poco abundante. Repetidamente comentada como especie rara en la Península, poseemos pliegos en MAF-lich. que confirman su área peninsular como un elemento normal en los pisos meso y supramediterráneos de ombroclimas subhúmedos y secos (RIVAS-MARTÍNEZ, Lazaroa 1: 13. 1979) de las provincias corológicas mediterráneas ibero-levantinas, presentándose excepcionalmente en situaciones húmedas del piso termomediterráneo valenciano y catalán.

Phaeophyscia hirsuta Mereschk.

VALENCIA: Alzira, Font del Pelegrí (50 m). Sobre *Olea europaea* L. Frecuente. No conocemos citas españolas anteriores.

Schismatomma picconianum (Bagl.) Steiner

VALENCIA: Alzira, Font del Pelegrí (50 m) y Segart (450 m). Sobre *Olea europaea* L. y *Ceratonia siliqua* L. Frecuente. Sólo conocemos del territorio español la cita para Baleares (Mallorca) de MAHEU & GILLET en Bull. Soc. Bot. France 69: 197 (1922).

