

Catálogo florístico del Cañón del río Duratón (Segovia, España)

II. ROSACEAE A UMBELLIFERAE

C. Cebolla, M. A. Rivas & C. Soriano (*)

Resumen: Cebolla, C., Rivas, M. A. & Soriano, C. *Catálogo florístico del Cañón del río Duratón (Segovia). II. Rosaceae a Umbelliferae. Lazaroa, 4: 227-240 (1982).*

Este trabajo es continuación del publicado en Lazaroa, 3: 197-217 (1981). Se citan 147 táxones de las familias comprendidas entre *Rosaceae* y *Umbelliferae*.

Abstract: Cebolla, C., Rivas, M. A. & Soriano, C. *FLoristic catalogue of the Duraton Canyon (Segovia). II. Rosaceae to Umbelliferae. Lazaroa, 4: 227-240 (1982).*

This paper continues this one previously published in Lazaroa 3 (1981): 197-217. 147 taxa are reported belonging to the families included between those of *Rosaceae* and *Umbelliferae*.

Relación de familias incluidas en este trabajo:

<i>Aceraceae</i>	<i>Guttiferae</i>	<i>Rhamnaceae</i>
<i>Anacardiaceae</i>	<i>Haloragaceae</i>	<i>Rosaceae</i>
<i>Araliaceae</i>	<i>Hippocastanaceae</i>	<i>Rutaceae</i>
<i>Celastraceae</i>	<i>Leguminosae</i>	<i>Simaroubaceae</i>
<i>Cistaceae</i>	<i>Linaceae</i>	<i>Thymelaeaceae</i>
<i>Cornaceae</i>	<i>Lythraceae</i>	<i>Umbelliferae</i>
<i>Cucurbitaceae</i>	<i>Malvaceae</i>	<i>Violaceae</i>
<i>Euphorbiaceae</i>	<i>Onagraceae</i>	<i>Vitaceae</i>
<i>Geraniaceae</i>	<i>Polygalaceae</i>	<i>Zygophyllaceae</i>

Acer monspessulanum L., Sp. Pl. 1056. 1753.

En las repisas de los roquedos y en el fondo de la hoz.

(*) Departamento de Botánica, Universidad Autónoma de Madrid.

Acer pseudoplatanus L., Sp. Pl. 1054. 1753.

Sepúlveda, VL 36.71, barranco tributario del río Castilla; VL 33.72, en la ribera del Duratón. Asilvestrado. Probablemente procedente de las plantaciones de la carretera situadas en VL 36.71.

Adenocarpus complicatus (L.) Gay Ann. Sci. Nat. ser. 2 (Bot.), 6: 125. 1836. subsp. complicatus.

Sepúlveda, VL 35.72, en los aluviones del fondo de la hoz; Villar de Sobrepeña, VL 32.71, en la cuesta entre el páramo y la alineación de cantiles.

Aesculus hippocastanum L., Sp. Pl. 344. 1753.

Sepúlveda, VL 33.71, en la ribera del Duratón; VL 34.72, un pie joven como fisurícola en los cantiles de la hoz. Naturalizado.

Agrimonia eupatoria L., Sp. Pl. 448. 1753. subsp. eupatoria.

Sepúlveda, VL 35.72, VL 36.71. En los aluviones del fondo de la hoz.

Ailanthus altissima (Miller) Swingle, Jour. Washington Acad. Sci. 6: 490. 1916.

Sepúlveda, VL 32.72, ribera del Duratón. Naturalizado.

Althaea cannabina L., Sp. Pl. 686. 1753.

Sepúlveda, VL 34.72, en los aluviones del fondo de la hoz.

Althaea officinalis L., Sp. Pl. 686. 1753.

Sebúlcor, VL 29.71, ribera del río San Juan.

Amelanchier ovalis Medicus, Gesch. Bot. 79. 1793.

Sepúlveda, VL 36.71, VL 37.71; Sebúlcor, VL 29.71; Villar de Sobrepeña, VL 34.71. Común en las repisas de los cantiles de umbria.

Anthriscus caucalis Bieb., Fl. Taur.—Cauc. 1: 230. 1808.

Villar de Sobrepeña, VL 30.72, VL 34.71; Carrascal del Río, VL 26.75; Sepúlveda, VL 36.71. En repisas con suelo somero. Común.

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., Gen. Umb. 40. 1814.

Carrascal del Río, VL 26.75; Sepúlveda, VL 36.71, VL 36.72. En enclaves nitrificados al pie de los cantiles.

Anthyllis vulneraria L., Sp. Pl. 719. 1753. s. l.

Sebúlcor, VL 29.71, en la hoz del río San Juan; Villar de Sobrepeña, VL 35.71; Sepúlveda, VL 36.71, VL 37.71. Común en los roquedos y coluviones de piedemonte.

***Apium nodiflorum* (L.) Lag., Amen. Nat. 1: 101. 1821.**

Sepúlveda, VL 36.72, junto a una fuente.

***Astragalus hamosus* L., Sp. Pl. 758. 1753.**

Sepúlveda, VL 35.72, coluviones de piedemonte en solana.

***Astragalus glycyphyllos* L., Sp. Pl. 758. 1753.**

Sepúlveda, VL 30.72, VL 36.72. Común en los aluviones del fondo de la hoz.

***Astragalus granatensis* Lam., Encycl. Méth. Bot. 1: 321. 1783. subsp. *granatensis*.**

Sepúlveda, VL 36.71; Villar de Sobrepeña, VL 34.71, Alto de las Canteras. Es frecuente en zonas sobrepastoreadas de la paramera, desde donde penetra hasta el borde de las hoces.

***Astragalus incanus* L. subsp. *macrorhizus* (Cav.) Chater, Feddes Repert. 79: 52. 1968.**

Sepúlveda, VL 36.71; Villar de Sobrepeña, VL 32.71. En cuevas y piedemontes margosos. Común.

***Bryonia cretica* L. subsp. *dioica* (Jacq.) Tutin, Feddes Repert. 79: 61. 1968.**

Sepúlveda, VL 36.71. Común al pie de los cantiles.

***Bupleurum baldense* Turra, Gior. Ital. Sci. Nat. Agric. Arti Commerc. 1: 120. 1764. subsp. *baldense*.**

Carrascal del Río, VL 26.75, alrededores de la Ermita de San Frutos. En repisas de cantiles con suelo esquelético.

***Bupleurum gerardi* All., Mélang. Philos. Math. Soc. Roy. Turin (Misc. Taur.) 5: 81. 1774.**

Sepúlveda, VL 36.71.

***Cistus albidus* L., Sp. Pl. 524. 1753.**

Sebúlcor, VL 29.71, en las laderas y cantiles del valle del río San Juan; VL 26.74, en las arenas del borde del cañón; Sepúlveda, VL 30.72, piedemonte.

***Cistus laurifolius* L., Sp. Pl. 523. 1753.**

Sebúlcor, VL 30.71, laderas del barranco del río San Juan; Sepúlveda, VL 36.71, VL 37.71, quejigar.

***Colutea atlantica* Browicz, Monogr. Bot. (Warszawa) 14: 127. 1963.**

Sepúlveda, VL 36.71, barranco tributario del río Caslilla; VL 37.71, quejigar.

Conium maculatum L., Sp. Pl. 243. 1753.

Sepúlveda, VL 36.71, en los aluviones del fondo de la hoz.

Conopodium capillifolium (Guss.) Boiss., Voy. Bot. Midi Esp. 2: 736. 1845.

Sepúlveda, Villar de Sobrepeña, VL 35.71; Sebúlcór, VL 29.71, hoz del río San Juan. En los aluviones del fondo de las hoces.

Conopodium majus (Gouan) Loret in Loret & Barrandon, Fl. Montpell. ed. 2, 214. 1886.

Villar de Sobrepeña, VL 30.72, repisas entre cantiles.

Cornus sanguinea L., Sp. Pl. 117. 1753.

Sepúlveda, VL 36.71, VL 32.72. En el fondo de la hoz y en repisas con suelo profundo de los cantiles de umbría.

Coronilla minima L., Cent. Pl. 2: 28. 1756.

Sepúlveda, VL 36.71, VL 37.71; Villar de Sobrepeña, VL 34.71; Carrascal del Río, VL 26.75. En repisas entre escarpes y en coluviones de piedemonte.

Coronilla scorpioides (L.) Koch, Syn. Fl. Germ. 188. 1835.

Sepúlveda, VL 36.72.

Coronilla valentina L. subsp. **glauca** (L.) Batt. in Batt. & Trabut, Fl. Algér. (Dicot.) 285. 1889.

Carrascal del Río, VL 26.75, en los escarpes de los alrededores de la Ermita de San Frutos.

Crataegus monogyna Jacq., Fl. Austr. 3: 50. 1775.

Sepúlveda, VL 36.71, VL 32.72. Aluviones del fondo de la hoz y repisas de suelo profundo entre cantiles. Frecuente.

Cydonia oblonga Miller, Gard. Dict. ed. 8, no. 1. 1768.

Sepúlveda, VL 33.72. Cultivos abandonados del fondo de la hoz.

Cytisus scoparius (L.) Link, Enum. Hort. Berol. Alt. 2: 241. 1822. subsp. **sco-
parius**.

Sepúlveda, VL 33.72. Sólo hemos visto una mata en las arenas aluviales del fondo de la hoz.

Daucus crinitus Desf., Fl. Atl. 1: 242. 1798.

Sepúlveda, VL 35.72, VL 36.72, VL 37.71. Común.

Dorycnium pentaphyllum Scop., Fl. Carn. ed. 2, 2: 87. 1772. subsp. **pentaphyllum**.

Villar de Sobrepeña, VL 34.71, VL 32.71. En cuevas entre cantiles. Raro.

***Epilobium tetragonum* L., Sp. Pl. 348. 1753. subsp. *tetragonum*.**

Sepúlveda, VL 36.72, ribera del Duratón.

***Epilobium hirsutum* L., Sp. Pl. 347. 1753.**

Sebúlcór, VL 29.71, ribera del río San Juan; Sepúlveda, VL 36.71, ribera del Duratón; VL 36.72, en una fuente. Muy abundante.

***Euonymus europaeus* L., Sp. Pl. 197. 1753.**

Sepúlveda, VL 32.72, ribera del Duratón; Villar de Sobrepeña, VL 30.72, repisas umbrosas con suelo profundo.

***Euphorbia helioscoides* Loscos & Pardo, Ser. Pl. Arag. 93. 1863.**

Sepúlveda, VL 32.72, VL 28.72. Coluviones de piedemonte.

***Euphorbia serrata* L., Sp. Pl. 459. 1753.**

Sepúlveda, VL 32.72.

***Erodium ciconium* (L.) L'Hér. in Aiton, Hort. Kew. 2: 415. 1789.**

Sepúlveda, VL 34.72, VL 36.72; Carrascal del Río, VL 26.75. En enclaves ruderalizados.

***Erodium cicutarium* (L.) L'Hér. in Aiton, Hort. Kew. 2: 414. 1789. subsp. *cutarium*.**

Sepúlveda, VL 32.72.

***Eryngium campestre* L., Sp. Pl. 233. 1753.**

Sepúlveda, VL 36.71, VL 37.71. En cuestras y piedemontes.

***Foeniculum vulgare* Miller subsp. *piperitum* (Ucria) Coutinho, Fl. Port. 450. 1913.**

Sepúlveda, VL 35.72, VL 36.71, en laderas y coluviones.

***Fragaria vesca* L., Sp. Pl. 494. 1753.**

Sepúlveda, VL 36.71, en el fondo de un barranco tributario del río Caslilla. Rara.

***Fumana ericoides* (Cav.) Gand. in Magnier, F. Select. Exsicc. no. 201. 1833.**

Sepúlveda, VL 37.73; Sebúlcór, VL 29.71. En repisas de roquedos y coluviones de piedemonte en exposiciones de solana.

***Fumana procumbens* (Dunal) Gren. & Godron, Fl. Fr. 1: 173. 1847.**

Sepúlveda, VL 36.71, VL 37.71; Villar de Sobrepeña, VL 35.72. Más abundante que la especie anterior, se sitúa en exposiciones menos abrigadas.

GUINEA (1954) no recoge citas de esta especie, ni de la anterior, en la provincia de Segovia.

Genista scorpius (L.) DC. in Lam. & DC., Fl. Fr. ed. 3, 4: 498. 1805.

Villar de Sobrepeña, VL 35.71, VL 36.71, ladera; Sebúlcór, VL 29.71, barranco del río San Juan.

Geranium columbinum L., Sp. Pl. 682. 1753.

Sepúlveda, VL 35.72, en coluviones de piedemonte.

Geranium lucidum L., Sp. Pl. 682. 1753.

Sepúlveda, VL 36.71; Carrascal del Río, VL 26.75. Al pie de los cantiles, en exposiciones de umbría.

Geranium molle L., Sp. Pl. 682. 1753.

Carrascal del Río, VL 26.75, en coluviones.

Geranium purpurem Vill. in L., Syst. Pl. Eur. 1, Fl. Delph.: 72. 1785.

Sepúlveda, VL 36.71, VL 30.72; Carrascal del Río, VL 26.75.

Geranium pusillum L., Syst. Nat. ed. 10, 2: 1144. 1759.

Sepúlveda, VL 36.71, en los aluviones del fondo de la hoz.

Geranium pyrenaicum Burm. fil., Spec. Bot: Geran. 27. 1759.

Sepúlveda, VL 36.71; Sebúlcór, VL 29.71; Carrascal del Río, VL 26.75; Villar de Sobrepeña, VL 30.72. En exposiciones de umbría.

Geranium robertianum L., Sp. Pl. 681. 1753.

Villar de Sobrepeña, VL 30.72, en los aluviones del fondo de la hoz.

Geranium sanguineum L., Sp. Pl. 683. 1753.

Sepúlveda, VL 36.71, al pie de los cantiles del cerro de Redilón.

Geum sylvaticum Pourret, Mém. Acad. Toulouse 3: 319. 1788.

Sepúlveda, VL 36.71, ladera margosa bajo los cantiles del Redilón.

Geum urbanum L., Sp. Pl. 501. 1753.

Villar de Sobrepeña, VL 30.72, VL 29.71; Sepúlveda, VL 36.71. En repisas con suelo profundo y en los aluviones del fondo de las hoces. Siempre en exposiciones umbrosas.

Hedera helix L., Sp. Pl. 202. 1753.

Sepúlveda, VL 36.71; Carrascal del Río, VL 26.75. Común en los cantiles.

Helianthemum apenninum (L.) Miller, Gard. Dict. ed. 8, no. 4. 1768.

Carrascal del Río, VL 26.75; Sebúlcór, VL 29.71, barroco del río San Juan; Sepúlveda, VL 36.72, coluviones de piedemonte; Villar de Sobrepeña, VL 30.72.

Helianthemum canum (L.) Baumg., enum. Stirp. Transs. 2: 85. 1816. subsp. **canum**.

Sepúlveda, VL 36.71; Villar de Sobrepeña, VL 34.71. En cuestras entre cantiles.

Helianthemum canum (L.) Baumg. subsp. **piloselloides** (Lapeyr.) M. C. F. Proctor, Feddes Repert. 79: 58. 1968.

Villar de Sobrepeña, VL 35.71, VL 35.72.

Helianthemum cinereum (Cav.) Pers., Syn. Pl. 2: 76. 1806.

Sepúlveda, VL 30.72, VL 37.71; Sebúlcór, VL 29.71; Villar de Sobrepeña, VL 34.71. Común en laderas, repisas entre cantiles y coluviones de piedemonte.

Helianthemum croceum (Desf.) Pers., Syn. Pl. 2: 79. 1806.

Carrascal del Río, VL 26.74; Sebúlcór, VL 29.71; Sepúlveda, VL 30.72.

Helianthemum hirtum (L.) Miller, Gard. Dict. ed. 8, no. 14. 1768.

Sebúlcór, VL 29.71, en repisas del roquedo del cañón del río San Juan.

Helianthemum salicifolium (L.) Miller, Gard. Dict. ed. 8, no. 21. 1768.

Sepúlveda, VL 30.72, VL 36.71; Sebúlcór, VL 29.71; Villar de Sobrepeña, VL 35.72.

Heracleum sphondylium L., Sp. Pl. 249. 1753. subsp. **sphondylium**.

Sepúlveda, VL 36.71; Villar de Sobrepeña, VL 30.72. En los aluviones del fondo de la hoz.

Hippocrepis ciliata Willd., Ges. Naturf. Freunde Berlin Mag. 2: 173. 1808.

Sepúlveda, VL 35.72, coluviones de piedemonte.

Hippocrepis commutata Pau, Bol. Soc. Aragon. Ci. Nat. 2: 274. 1903.

Carrascal del Río, VL 26.75, alrededores de la ermita de San Frutos; Villar de Sobrepeña, VL 35.71, en arenas albenses.

Hypericum montanum L., Fl. Suec. ed. 2, 266. 1755.

Sepúlveda, VL 30.72, aluviones.

Hypericum perforatum L., Sp. Pl. 785. 1753.

Sepúlveda, VL 36.71, VL 36.72.

Lathyrus cicera L., Sp. Pl. 730. 1753.

Sepúlveda, VL 36.71, barranco tributario del río Caslilla.

Lathyrus pratensis L., Sp. Pl. 733. 1753.

Sepúlveda, VL 34.72, en los aluviones del fondo de la hoz.

Linum narbonense L., Sp. Pl. 278. 1753.

Sepúlveda, VL 36.72, VL 36.71; Sebúlcór, VL 29.71; Villar de Sobrepeña, VL 34.71. Común en laderas, roquedos y piedemontes.

Linum suffruticosum L., Sp. Pl. 279. 1753. subsp. *suffruticosum*.

Sebúlcór, VL 29.71; Sepúlveda, VL 37.71. En laderas, repisas entre cantiles y coluviones de piedemonte.

Las muestras de *L. suffruticosum*, colectadas por nosotros han sido revisadas por el Dr. Rivas Martínez y en su opinión, deben ser adscritas a la subsp. *differens* (Pau) Rivas Goday & Rivas Martínez.

Lotus corniculatus L., Sp. Pl. 1775. 1753.

Sepúlveda, VL 36.71. En las repisas de los roquedos, laderas y coluviones.

Lythrum salicaria L., Sp. Pl. 446. 1753.

Sebúlcór, VL 29.71, ribera del río San Juan; Sepúlveda, VL 36.71, ribera del Duratón. Común.

Malus domestica Borkh., Handb. Forstbot. 2: 1272. 1803.

Sepúlveda, VL 33.72. Plantaciones abandonadas en el fondo de las hoces.

Malva neglecta Wallr., Syll. Pl. Nov. Ratisbon. (Königl. Baier. Bot. Ges.) 1: 440. 1824.

Sepúlveda, VL 36.71, aluviones.

Malva sylvestris L., Sp. Pl. 689. 1753.

Carrascal del Río, VL 26.75; Sepúlveda, VL 32.72. Enclaves ruderalizados al pie de los cantiles.

Medicago arabica (L.) Hudson, Fl. Angl. 288. 1762.

Sepúlveda, VL 30.72, aluviones del fondo del cañón.

Medicago lupulina L., Sp. Pl. 779. 1753.

Sepúlveda, VL 30.72, VL 36.71.

Medicago minima (L.) Bartal., Cat. Pianta Siena 61. 1776.

Sebúlcór, VL 29.71; Sepúlveda, VL 29.72, VL 36.72; Villar de Sobrepeña, VL 34.71. Roquedos, piedemontes, laderas.

Medicago rigidula (L.) All., Fl. Pedem. 1: 316. 1785.

Sepúlveda, VL 36.72, ladera de solana junto al pueblo; Carrascal del río, VL 27.74, ladera de solana.

Medicago sativa L., Sp. Pl. 778. 1753. subsp. **sativa**.

Villar de Sobrepeña, VL 30.72; Sepúlveda, VL 36.71. Común.

Melilotus indica (L.) All., Fl. Pedem. 1: 308. 1785.

Sepúlveda, VL 36.72, aluviones.

Melilotus officinalis (L.) Pallas, Reise 3: 537. 1776.

Sepúlveda, VL 36.71, en los aluviones del fondo de la hoz; VL 36.72, ladera de solana junto al pueblo.

Mercurialis tomentosa L., Sp. Pl. 1035. 1753.

Sepúlveda, VL 36.71, ladera al pie de los cantiles del Redilón.

Myrrhoides nodosa (L.) Cannon, Feddes Repert. 79:65. 1968.

Sepúlveda, VL 36.71, en aluviones.

Myriophyllum sp.

Sebúlcór, VL 27.74, embalse de Burgomillodo. Recolectada el 29.07.1980, carecía de los elementos necesarios para la identificación de la especie.

Oenanthe crocata L., Sp. Pl. 254. 1753.

Villar de Sobrepeña, VL 30.72, en aluviones.

Onobrychis argentea Boiss. subsp. **hispanica** (Sirj.) P. W. Ball, Feddes Repert. 79: 42. 1968.

Sepúlveda, VL 36.71, ladera al pie de los cantiles del Redilón.

Ononis aragonensis Asso, Syn. Stirp. Arag. 96. 1779.

Sepúlveda, VL 35.71; Sebúlcór, VL 30.71; Villar de Sobrepeña, VL 33.71; Carrascal del Río, VL 26.75, VL 26.74. En repisas con suelo profundo de los cantiles de umbria. La mayor parte de estas citas han sido publicadas. (FUENTE, V. de la & al., 1980).

Ononis natrix L., Sp. Pl. 717. 1753. subsp. **natrix**.

Sebúlcór, VL 29.71, cañón del río San Juan.

Ononis pusilla L., Syst. Nat. ed. 10, 2: 1159. 1759.

Sepúlveda, VL 36.71, VL 37.71. En coluviones de piedemonte y en laderas cascajosas.

Ononis reclinata L., Sp. Pl. ed. 2, 1011. 1763.

Sepúlveda, VL 30.72.

Ononis spinosa L. subsp. **antiquorum** (L.) Arcangeli, Comp. Fl. Ital. 157. 1882.

Sepúlveda, VL 36.71; Villar de Sobrepeña, VL 32.72. En laderas entre cantiles y piedemontes margosos.

Pastinaca sativa L. subsp. **sylvestris** (Miller) Rouy & Camus, Fl. Fr. 7: 372. 1901.

Sepúlveda, VL 28.72, VL 35.72; Sebúlcór, VL 29.71, barranco del río San Juan. En aluviones.

Petroselinum crispum (Miller) A. W. Hill, Hand-list Herb. Pl. Kew ed. 3, 122. 1925.

Villar de Sobrepeña, VL 30.72; Sepúlveda, VL 33.72. En repisas umbrías de roquedos con acumulación de residuos vegetales. Naturalizado.

Pistacia terebinthus L., Sp. Pl. 1025. 1753.

Sepúlveda, VL 32.72, VL 35.72. En coluviones y roquedos de solana.

Polygala monspeliaca L., Sp. Pl. 702. 1753.

Sepúlveda, VL 35.72, VL 36.71. En repisas con escaso suelo y en coluviones de solana.

Polygala nicaeensis Risso ex Koch subsp. **caesalpinii** (Bubani) McNeill, Feddes Repert. 79: 32. 1968.

Sepúlveda, VL 36.71, VL 35.71. En laderas y repisas con suelo profundo. En exposiciones de umbría.

Potentilla reptans L., Sp. Pl. 499. 1753.

Sebúlcór, VL 29.71, barranco del río San Juan; Villar de Sobrepeña, VL 32.72; Sepúlveda, VL 36.71. En aluviones.

Potentilla tabernaemontani Ascherson, Verh. Bot. Ver. Brandenb. 32: 156. 1891.

Sepúlveda, VL 32.72; Villar de Sobrepeña, VL 35.72. Común en laderas y piedemontes.

Prunus avium L., Fl. Succ. ed. 2, 165. 1755.

Sepúlveda, VL 28.72, VL 36.72, VL 36.71. Hay ejemplares residuales procedentes de antiguas plantaciones en los aluviones del Duratón. Pies dispersos en setos y riberas, ¿espontáneos?

Prunus cerasus L., Sp. Pl. 474. 1753.

Sepúlveda, VL 32.72. Pies procedentes de antiguos cultivos.

Prunus domestica L., Sp. Pl. 475. 1753. subsp. domestica.

Sepúlveda, VL 33.71. En aluviones. Cultivos abandonados.

Prunus dulcis (Miller) D. A. Webb, Feddes Repert. 74: 24. 1967.

Sepúlveda, VL 36.71, VL 35.72. Cultivos aterrazados en laderas y piedemontes, actualmente abandonados. Pies asilvestrados en roquedos y coluviones.

Prunus mahaleb L., Sp. Pl. 474. 1753.

Sepúlveda, VL 33.72. Hemos visto un sólo ejemplar de esta especie en los aluviones de la hoz.

Prunus spinosa L., Sp. Pl. 475. 1753.

Sepúlveda, VL 32.72, VL 36.71. Común.

Psoralea bituminosa L., Sp. Pl. 763. 1753.

Sepúlveda, VL 36.71, CL 34.72. En laderas y piedemontes soleados.

Pyrus communis L., Sp. Pl. 479, 1200. 1753.

Sepúlveda, VL 28.72. Plantaciones abandonadas en el fondo de la hoz.

Rhamnus alaternus L., Sp. Pl. 193. 1753. subsp. alaternus.

Sepúlveda, VL 30.72, CL 32.72; Villar de Sobrepeña, VL 35.72. En laderas, piedemontes y aluviones. Sebúlcór, VL 29.71, Sepúlveda, VL 27.74. En roquedos.

En FUENTE, V. de la & al., 1980, citábamos erróneamente como subsp. *myrtifolius* (Willk.) Maire, las formas de *R. alaternus* que aparecen en roquedos adoptando portes prostrados. Se trata probablemente de la forma *parvifolia* (Lange) Rivas-Martínez de la subsp. *alaternus*, según nos ha comunicado el Dr. Rivas-Martínez tras la revisión de los pliegos.

Rhamnus catharticus L., Sp. Pl. 193. 1753.

Sepúlveda, VL 35.72, VL 36.71, VL 32.72. En el fondo de hoces y barrancos, formando parte de setos y riberas.

Rhamnus lycioides L., Sp. Pl. ed. 2, 279. 1762. subsp. lycioides.

Sepúlveda, VL 28.72; Villar de Sobrepeña, VL 30.72; Carrascal del Río, VL 26.74. En repisas de roquedos y en piedemontes.

Rhamnus pumilus Turra, Gior. Ital. Sci. Nat. Agric. Arti Commerc. 1: 120. 1764.

Sepúlveda, VL 36.71, VL 32.72; Sebúlcór, VL 29.71; Villar de Sobrepeña, VL 34.71. Común en los roquedos.

Rhamnus saxatilis Jacq., Enum., Vindob. 39, 212. 1762. subsp. **saxatilis**.

Sepúlveda, VL 28.72, VL 36.71. Frecuente. En laderas, repisas y piedemontes.

Rosa agrestis Savi, Fl. Pis. 1: 475. 1798.

Sepúlveda, VL 36.71, en el fondo de la hoz.

Rosa corymbifera Borkh., Vers. Forstbot. Beschr. Holzart. 319. 1790.

Sepúlveda, VL 36.71, aluviones.

Rosa micrantha Borrer ex Sm. in Sowerby, Engl. Bot. 35: t. 2490. 1812.

Villar de Sobrepeña, VL 30.72, VL 34.71; Carrascal del Río, VL 26.75; Sepúlveda, VL 28.72, VL 36.71. En repisas con suelo profundo, laderas y fondo de hoces. En exposiciones de umbría.

Rosa squarrosa (Rau) Boreau, Fl. Centre Fr. ed. 3, 2: 222. 1857.

Sepúlveda, VL 36.72, coluviones de piedemonte. Determinó C. Arnáiz.

Rubus caesius L., Sp. Pl. 493. 1753.

Sepúlveda, VL 35.71, VL 36.72. En los aluviones del Duratón.

Rubus ulmifolius Schott, Isis 1818: 821. 1818.

Sepúlveda, VL 36.72. Común en el fondo de las hoces.

Ruta montana (L.) L., Amoen. Acad. 3: 52. 1756.

Sepúlveda, VL 36.72, coluviones de piedemonte en solana; VL 37.71, en el borde de la paramera.

Sanguisorba minor Scop. subsp. **magnolii** (Spach) Briq., Prodr. Fl. Corse 2 (1): 209. 1913.

Sepúlveda, VL 37.71, en el borde del páramo.

Sanguisorba minor Scop., Fl. Carn. ed. 2, 1: 110. 1772. subsp. **minor**.

Sepúlveda, VL 36.71; Carrascal del Río, VL 27.74. En laderas, repisas de roquedos y coluviones.

Sanguisorba minor Scop. subsp. **muricata** Briq., Prodr. Fl. Corse 2 (1): 210. 1913.

Sepúlveda, VL 37.71, quejigar; VL 36.71, aluviones.

Scandix australis L., Sp. Pl. 257. 1753. subsp. **australis**.

Sepúlveda, VL 29.72, «El Barranco», coluviones.

Scandix pecten-veneris L., Sp. Pl. 256. 1753.

Carrascal del Río, VL 26.75. En enclaves ruderalizados al pie de los cantiles de umbría.

Seseli montanum L., Sp. Pl. 260. 1753. subsp. **montanum**.

Sepúlveda, VL 36.71, en repisas de los roquedos del Redilón.

Sorbus aria (L.) Crantz, Stirp. Austr. 2: 46. 1763. subsp. **aria**.

Sepúlveda, VL 36.71, VL 36.72. Roquedos.

Thymelaea pubescens (L.) Meissner in DC., Prodr. 14: 558. 1857.

Sepúlveda, VL 37.73; Sebúlcór, VL 29.71. En laderas.

Tordylium maximum L., Sp. Pl. 240. 1753.

Sepúlveda, VL 36.72. Aluviones.

Torilis arvensis (Hudson) Link, Enum. Hort. Berol. Alt. 1: 265. 1821. subsp. **arvensis**.

Sepúlveda, VL 37.71, VL 35.71. Común en zonas pastoreadas no umbrosas.

Torilis leptophylla (L.) Reichenb. fil. in Reichenb. & Reichenb. fil., Icon. Fl. Germ. 21: subt t. 169. 1866.

Sepúlveda, VL 36.72, VL 37.71; Carrascal del Río, VL 26.75. En zonas pastoreadas.

Tribulus terrestris L., Sp. Pl. 387. 1753.

Sepúlveda, VL 36.72, en una ladera de solana pastoreada.

Trifolium campestre Schreber in Sturm, Deutschl. Fl. Abt. 1, Band 4, Heft 16. 1804.

Sepúlveda, VL 29.72, «El Barranco»; VL 36.72, en coluviones.

Trifolium pratense L., Sp. Pl. 768. 1753.

Sepúlcór, VL 29.71; Villar de Sobrepeña, VL 30.72, Sepúlveda, VL 36.72. En el fondo de las hoces.

Trifolium repens L., Sp. Pl. 767. 1753. subsp. **repens**.

Sepúlveda, VL 30.72, VL 36.71; Sebúlcór, VL 29.71. En aluviones.

Trigonella gladiata Steven ex Bieb., Fl. Taur.-Cauc. 2: 222. 1808.

Sepúlveda, VL 35.72, piedemonte en solana.

Trinia glauca (L.) Dumort., Fl. Belg. 78. 1827. subsp. **glauca**.

Sepúlveda, VL 36.71, barranco tributario del río Caslilla.

Vicia onobrychioides L., Sp. Pl. 735. 1753.

Sepúlveda, VL 36.71, barranco tributario del río Caslilla.

***Vicia pannonica* Crantz. subsp. *striata* (Bieb.) Nyman, Consp. 209. 1878.**

Sepúlveda, VL 33.72, VL 30.72. En los prados del fondo de la hoz.

***Vicia sativa* L. subsp. *nigra* (L.) Ehrh., Hannover. Mag. 1780 (15): 229. 1780.**

Sepúlveda, VL 36.71; Sebúlcór, VL 29.71, cañón del río San Juan.

***Viola odorata* L., Sp. Pl. 934. 1753.**

Carrascal del Río, VL 26.74. En umbrías.

***Viola kitaibeliana* Schultes in Roemer & Schultes, Syst. Veg. 5: 383. 1819.**

Sepúlveda, VL 36.71, VL 32.72; Villar de Sobrepeña, VL 30.72; Sebúlcór, VL 26.74. En repisas con escaso suelo.

***Vitis vinifera* L., Sp. Pl. 202. 1753. subsp. *vinifera*.**

Sepúlveda, VL 30.72. Ejemplares residuales de antiguos viñedos en los aluviones de la hoz.

BIBLIOGRAFIA

- Cebolla, C., Fuente, V. de la Morla, C., Rivas, M. A., Sáinz, H. y Soriano, C. —1981— Catálogo florístico del Cañón del río Duratón (Segovia, España). I. Equisetaceae a Grossulariaceae — *Lazaroa*, 3: 197-217, Madrid.
- Fuente, V. de la, Morla, C., Rivas, M. A., Sáinz, H. y Soriano, C. —1980— Notas florísticas sobre los afloramientos cretácicos del sector oriental de la Cordillera Central — *An. Inst. Bot. Cavanilles*, 35: 115-119. (1978), Madrid.
- Guinea, E. —1954— Cistáceas españolas. Inst. Forestal de Investigaciones y Experiencias, Madrid.