

## Datos florísticos para la provincia de Orense

C. Morla (\*)

**Resumen:** Morla, C. *Datos florísticos para la provincia de Orense. Lazaroa*, 4: 393-396 (1982).

Se citan algunos táxones de la provincia de Orense que presentan cierto interés ecológico o corológico.

**Abstract:** Morla, C. *Floristical data from the Orense provincia. Lazaroa*, 4: 393-396 (1982).

Some taxa from the Orense provincia of ecological or chorological interest are briefly related.

En la presente nota se relacionan algunos táxones cuyas citas presentan algún interés ecológico o corológico para el conjunto de la flora provincial. Las citas se localizan en las sierras centrales (S. Mamés, Manzaneda, Queixa) y en el sector oriental de la provincia (todas ellas situadas, según la designación UTM en el huso 29, zona T, cuad. PG y PH).

*Allium victorialis* L., Sp. Pl. 295. 1753. Abundante al borde de los arroyos del Bosque de Teixedo en la Sierra de San Maméd, proximidades de Montederramo, PG 28 77.

Merino, Fl. Galic. 3: 692. 1909, consideraba esta especie escasa en Galicia y Castroviejo, Trab. Dep. Bot. y Fisio. Veg. Univ. Compl., 7: 11-17, 1975, la señala para la provincia en los próximos Montes del Invernadeiro.

*Calamagrostis arundinacea* (L.) Roth, Tent. Fr. Germ. 2 (1): 89. 1789. Localizada en la Sierra de Queixa en los lugares denominados Carballal de Ferreria PG 28 75, y Acebral de Taboazas PG 32 73, en ambientes frescos y nemorales. Merino, (op. cit.), sólo indica esta especie en las proximidades de Las Ermitas (El Bollo), y Láinz, Anuar. Soc. Brot., 31: 9-13, 1965, la señala en los confines provinciales.

---

(\*) Departamento de Botánica, Universidad Autónoma de Madrid.

**Centaurium maritimum** (L.) Fritsch, Mitt. Naturw. Ver. Wien 5: 97. 1907. Chandoiro PG 52 88, común en los prados de fuerte pendiente de las riberas del río Jares. Láinz, Aport. conoc. Flor. Gall. VII: 39, 1971, ya la indicaba en la provincia, cerca de Rubiana.

**Cicendia filiformis** (L.) Delarbre, Fl. Auvergne ed. 2: 29. 1800. Pontenovo (Puebla de Trives) PG 49 93, corriente en paredes rezumantes. Láinz, Aport. conoc. Flor. Gall. VI: 39, 1968, da la primera localidad concreta provincial en las cercanías de Verín.

**Cistus laurifolius** L., Sp. Pl. 523. 1753. La colectamos en la zona oriental de la provincia, en las proximidades del pueblo de Covas PH 78 05, entre matorral de encina, sobre calizas. No conocemos otras referencias de esta especie en la región gallega. En el Bierzo leonés ya era señalada por Pourret (Colmeiro, Enum. y Rev. plant. pen. Hispan.-Lusit. I: 595, 1885). Esta especie también alcanza el norte de Portugal (Rozeira, A Flor. da Prov. Tras os Montes e Alto Douro: 203: 1944; Gandoger, Catal. plant. recolt. Esp. et Port.: 378, 1917).

**Cymbalaria muralis** P. Gaertner, B. Mayer & Scherb., Fl. Wetter 2: 397. 1800. subsp. **muralis**. En los escalones que dan entrada al santuario de las Ermitas (El Bollo), y en algunos muros de Puebla de Trives. En la provincia además de la referencia inconcreta de Buch (Soc. Sci. Fennica Commen. Biol., 10 (17): 1-98, 1951), Láinz (op. cit.) la cita de las proximidades de Ribadavia.

**Doronicum plantagineum** L., Sp. Pl. 885. 1753. Hemos colectado esta especie entre Cambela y Presa de Bao PG 53 80, en formaciones de *Quercus pyrenaica*; también abunda en las cercanías de Chandoiro PG 53 88, en los prados próximos al río Jares. Merino (Fl. Galic. 2: 634, 1906) no indica localidades orensanas para esta especie.

**Echinospartum lusitanicum** (L.) Rothm., Bot. Jahrb. 72: 82. 1941, subsp. **lusitanicum**, f. **pulviniformis** Riv. Mart., Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Biol.) 72: 14. 1974. Es abundante en los roquedos graníticos desnudos y venteados de Cabeza de Manzaneda PG 42 81, en orientaciones fundamentalmente meridionales. La especie, como *Genista lusitanica*, fue citada por Merino (Ad. Fl. Gal. Broteria ser. bot. 10-15: 1-211, 1917) en el extremo oriental de la provincia, y Bellot (Anal. Inst. Bot. Cavanilles 10 (1): 383-387, 1951) la señala en las proximidades de La Gudiña. Correspondiente a este mismo taxon se conserva en el herbario de la Facultad de Farmacia de Madrid un pliego (MAF 95086 Valdés & Castoviejo) procedente de la próxima sierra del Invernadeiro.

**Filipendula vulgaris** Moench, Meth. 663. 1794. Frecuente en las laderas umbrosas del curso bajo del río Jares, cerca de Portomourisco PG 55 89. Se añade esta cita a las ya aportadas por Láinz (Anal. Inst. Forest. Invest. 12: 1-51. 1967 y Aport. conoc. Flor. Gall. VII: 39, 1971) en la provincia, más orientales.

**Fritillaria pyrenaica** L., Sp. Pl. 304. 1753. Cabeza de Manzaneda PG 42 81, abundante en roquedos graníticos. Para la provincia fue localizada por Merino en el Monte Ramilo (Láinz, Broteria ser. cien. nat. 22 (4): 155-168, 1953). Acerca de esta especie en Galicia cf. también: Merino, Fl. Galic. Descr. Ilus. 3: 634, 1909; Láinz, Broteria ser. cien. nat. 24 (2-3): 108-143 y 24 (4): 153-160. 1955. Anal. Jard. Bot. Madrid. 14: 529-559. 1956. Anal. Inst. Forest. Invest. 12: 1-51. 1967.

**Geranium sanguineum** L. Sp. Pl. 683. 1753. Aunque Merino no la cita de la provincia en su Flora, Láinz detecta dos localidades en los materiales inéditos de aquel (Láinz, Broteria ser. cien. nat. vol. 22 (4): 155-168. 1953) y a su vez la indica en las cercanías de Viana del Bollo (Láinz, Anal. Inst. Forest. Invest. 12: 1-51. 1967). Nosotros hemos dado con dos enclaves en que abunda: prados próximos a Castiñeira (Villariño de Conso) PG 49 71, como mala hierba invasora, y en Portomourisco PG 49 71, sobre laderas pedregosas en la ribera del Jares. También la hemos visto, menos abundante, en las cercanías de Villar de Silva PH 78 03, sobre calizas.

**Helianthemum aegyptiacum** (L.) Miller, Gard. Dict. ed. 8 n.º 23. 1768. Proximidades de Portomourisco PG 55 89, sobre terrazas de cultivo abandonadas. Solo conocemos de la región gallega la localidad orensana de Rothmaler recogida por Láinz (Anal. Inst. Forest. Invest. 12: 1-51. 1967), ya que la indicación de Colmeiro es inconcreta (Enum. y Rev. Plant. Pen. Hisp.-Lus. 595. 1885).

**Humulus lupulus L.**, Sp. Pl. 1028. 1753. Corriente en los arroyos próximos a Puebla de Trives (Fiscaíño, Cavalar...). No nos consta que se haya citado con anterioridad en la provincia.

**Lythrum hissepifolia L.**, Sp. Pl. 447. 1753. Colectada en Pte. Bibey PG 47 88, al pie de taludes húmedos, escasa. Merino recoge en su Flora la referencia de Pourret para la provincia (Merino, Fl. Galic. 1: 620, 1905) y Láinz la cita en las proximidades de La Rúa (Aport. conoc. Flor. Gall. VI: 39. 1968).

**Muscari comosum (L.) Miller**, Gard. Dict. 8 (2) 1786. Abundante entre Puebla de Trives y Larouco PG 50 89, en prados de siega. La presencia en Orense de esta especie fue detectada por Láinz en los materiales inéditos de Merino (Broteria ser. cien. nat. 12 (4), 1953).

**Narcissus asturiensis (Jordan) Pugsley**, Jour. Roy. Hort. Soc. 58: 40. 1933. Abundante en las formaciones cespitosas de Cabeza de Manzaneda, por encima de 1300 m PG 41 79, Láinz la señala en Peña Trevinca (Anal. Inst. Forest. Invest., 10: 321, 1966) y Castroviejo la recoge en sus inventarios del Invernadeiro (Estud. Veg. Sierr. Inver., 77, 1977).

**Orchis morio L.**, Sp. Pl. 940. 1753. Chandoiro PG 52 88, en las pendientes praderas próximas al río Jares. Merino la citaba en las cercanías de Orense (Fl. Galic. 3: 84, 1909).

**Ornithogalum pyrenaicum L.**, Sp. Pl. 306. 1753. A las indicaciones orensanas de Merino (Fl. Galic. 3: 23, 1909) y de Dupont (Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse, 94: 265, 1959), añadamos que es frecuente en las comarcas de Trives y Rúa-Petin PG 55 89.

**Paeonia broteroi Boiss. & Reuter**, Diagn. Pl. Nov. Hisp. 4. 1842. Además de la población señalada por Merino en Requián, prox. Las Ermitas (Fl. Galic. 3: 507, 1909), hemos localizado numerosos ejemplares de esta especie en las pendientes del curso bajo del río Jares (Chandoiro-Portomourisco) PG 53 88. Aunque nuestra localidad dista poco de la de Merino, la señalamos por tratarse de una especie muy escasa en Galicia.

**Platanthera bifolia (L.) L.C.M. Richard**, Orcid. Eur. Annot. 35. 1817. Paradela (Manzaneda) PG 45 82, y Portomourisco (Petin) PG 55 89, frecuente en prados y taludes. Merino no la citaba en la provincia.

**Populus tremula L.**, Sp. Pl. 1034. 1753. Hemos encontrado esta especie, espontánea (1), formando pequeños grupos y más raramente pies aislados en diversos puntos de las cuencas de los ríos Jares y Bibey. Los mejores rodales aparecen en el curso bajo del primero de ellos, en pequeños valles afluentes siempre orientados a umbría, donde le acompañan *Acer pseudoplatanus*, *Alnus glutinosa*, *Prunus avium*, *Hypericum androsaemum*, *Lonicera periclymenum*,... apreciándose buena regeneración natural del «temblón». Reseñamos a continuación algunos puntos concretos donde aparece: Chandoiro PG 52 88, Portomourisco PG 55 89, Mendoya PG 45 87, Cobelo PG 55 85, Pontenovo PG 46 93, Larouco PG 51 89. Hay que destacar la baja cota altitudinal que alcanza en alguna de las localidades citadas (Pontenovo, 350 m); también lo hemos visto a mayor altitud en el alto Jares cerca de El Puente (La Vega) PG 73 80; y recojamos aquí la cita zamorana de Lusa España en el Macizo de Trevinca (Contr. Est. Fl. y Veg. prov. Zamora, 66, 1949) con la que parecen conectar, por su trayectoria, estas localidades orensanas.

Se confirma por tanto la presencia de esta especie en la comarca de Trives y en la región gallega, ya adelantada por Gandoger (Catal. Plant. Recolt. Espag. et Port., 301, 1949). Colmeiro recogía las indicaciones gallegas de Sarmiento y L. Alonso, sin especificar localidad (Colmeiro, Enum. y Rev. Plant. Penin. Hisp.-Lus. I, 692, 1885).

**Potentilla rupestris L.**, Sp. Pl. 496. 1753. En las laderas de umbría del curso bajo del Jares, cerca de Portomourisco PG 55 89, frecuente. Láinz la señala en Sobradelo y se refiere a la herborización orensana de Pourret (Aport. Conoc. Flor. Gall. VI, 10, 1968).

(1) Se encuentran también algunos pies aislados plantados en parques y carreteras de la zona.

**Prunus avium** L., Fl. Suec. 2.<sup>a</sup> ed. 165. 1755. Abunda en algunas carballeiras cerradas del valle del Navea PG 41 90. En la Provincia ya era señalada por Láinz (Anal. Inst. Forest. Invest. 10: 310, 1966; y Aport. conoc. Flor. Gall. 7: 10, 1971).

**Prunus padus** L. Sp. Pl. 473. 1753. subsp. **padus**. Frecuente en los bordes de los arroyos que atraviesan los bosques de Ferrería y Teixedo en el alto valle del Navea (Chandreja de Queixa) PG 28 77. Láinz la cita en los bosques de Casayo (Aport. conoc. Flor. Gall. VII: 10, 1971).

**Ranunculus platanifolius** L., Mantissa 79. 1767. Frecuente en las orillas del río Navea y sus afluentes en su curso alto (Ferreria-Edreira) PG 28 77, así como en los prados próximos a Zamorela de Queixa PG 26 75. La especie en la Provincia ya era señalada por Merino (Fl. Galic. 3: 501, 1909) y Láinz (Anuar. Soc. Brot. 31: 10, 1965 y Anal. Inst. Forest. Invest. 10: 302, 1966). Castroviejo la recoge en los inventarios que constan en su trabajo de vegetación sobre la Sierra del Invernadeiro (Estud. Veg. Sierr. Inver., 3-93, 1977).

**Salix caprea** L., Sp. Pl. 1020. 1753. En el Bosque de Teixedo (Queixa) PG 28 74, al borde de arroyos con *Betula celtiberica*, *Prunus padus*, *Corylus avellana*... En la provincia ya era indicada por Láinz (Aport. conoc. Flor. Gall. VII: 30, 1971) y Castroviejo (Trab. Dep. Bot. Univ. Compl. 7: 11, 1975).

**Silene foetida** Link ex Sprengel, Syst. Veg. ed. 16, 2: 406. 1825. Muy abundante en los cantiles de pizarra que encajan el muro del embalse de Las Portas (prox. Villariño de Conso) PG 45 70, donde baja hasta 750 m. De este interesante endemismo noroccidental ibérico existen varios testimonios en la provincia (Merino, Fl. Gal. 1: 214, 1905 y 3: 524, 1909; Castroviejo, Trab. Dep. Bot. Univ. Compl. 7: 12, 1975).

**Spiranthes aestivalls** (Poiret) L.C.M. Richard, Orchid. Eur. Annot. 36. 1817. En los prados próximos a Cimadevilla (Manzaneda) PG 49 87; la primera indicación orensana se debe a Láinz (Aport. conoc. Flor. Gall. VII: 31, 1971).

**Thymus caespititius** Brot., Fl. Lusit. 1: 176. 1804. Tapiza esporádicamente taludes y roquedos en las proximidades de Taboazas y Santa Cruz (Queixa) PG 29 77. En la provincia Merino señalaba su presencia, rara, en Verín y Monterrey (Fl. Galic. 2: 192, 1906 y 3: 581, 1909) (1). Las indicaciones gallegas que Willkom recoge de Levier y Leresche corresponden únicamente a la provincia de Pontevedra (Willkomm, Suppl. Prod. Flor. Hisp., 144, 1893., Lev. & Ler., Deux Excurs. Bot., 89, 1880).

**Tulipa sylvestris** L., subsp. **australis** (Link) Pamp., Bull. Soc. Bot. Ital. 1914: 114. 1914. Recolectada en Cabeza de Manzaneda y Seixo PG 42 81, y PG 33 75, por encima de 1300 m; la especie ya fue recogida por Merino en la provincia (Merino, Fl. Galic. 3: 32, 1909. Láinz, Broteria S.C. 22 (4): 157, 1953).

**Urospermum picroides** (L.) Scop. ex F.W. Schmidt, Samml. Phys. Aufs. Naturk. 275. 1795. En las proximidades de Puente Bibey PG 49 93, en cunetas y bordes de camino. Láinz la señalaba en Villar de Silva (Rubiana) como novedad regional (Anal. Inst. Forest. Invest. 12: 41, 1967).

(1) Buch no consideró la rectificación de Merino (Buch, Soc. Sci. Fenn. Commen. Biol, 10 (17): 66, 1951).