

Datos florísticos sobre la comarca de las Corchuelas (Parque Natural de Monfragüe, Cáceres, España). III.

D. Belmonte (*)

Resumen: Belmonte, D. *Datos florísticos sobre la comarca de las Corchuelas (Parque Natural de Monfragüe, Cáceres, España). III. Lazaroa, 5: 315-317 (1983).*

Se comentan brevemente algunos taxones herborizados en la comarca de las Corchuelas (Parque Natural de Monfragüe), sector Toledano-tagano, provincia corológica Luso-extremadurensis (RIVAS-MARTÍNEZ, S., Anal. Inst. Bot. Cavanilles, 30: 69-87. 1973).

Abstract: Belmonte, D. *Floristal data about las Corchuelas (Monfragüe Natural Park, Cáceres, Spain). III. Lazaroa, 5: 315-317 (1983).*

Several taxa collected at Corchuelas (Monfragüe Natural Park), Toledano-tagano sector, chorological province Luso-extremadurensis (RIVAS-MARTÍNEZ, S., Anal. Inst. Bot. Cavanilles, 30: 69-87. 1973) are briefly commented.

Delphinium pentagynum Lam., Encycl. Méth. Bot. 2: 264 (1786)

En claros de jaral (*Genisto hirsutae-Cistetum ladaniferi*). CÁCERES: Serradilla, Garganta de la Trasierra (MAF 109931).

Lindernia dubia (L.) Pennell, Scroph. E. Temp. N. Amer. 141 (1935)

Arenas del río Tiétar, comunidades subnitrofilas de *Heleochoilon*. CÁCERES: Malpartida de Plasencia, la Bazagona (MAF 109838).

Juncus acutus L., Sp. Pl. 325 (1753)

Juncuales sobre suelos arenosos meso-oligotrofos pseudogleizados (*Holoschoeno-Juncetum acuti*). CÁCERES: Saucedilla, El Ejido (MAF 108315).

(*) Departamento de Botánica, Facultad de Farmacia, Universidad Complutense, Madrid-3.

Marsilea strigosa Willd., Sp. Pl. 5 (1): 539 (1810)

Remansos de arroyos de aguas profundas que se desecan a la entrada del verano (*Preslion cervinae*). CÁCERES: Torrejón el Rubio, arroyo Retuerta (MAF 109881).

Mollugo verticillata L., Sp. Pl. 89 (1753)

Junto a *Mollugo cerviana* (L.) Serin DC., en comunidades subnitrófilas de *Heleochoilon*, así como en cultivos de tabaco y hortalizas (*Polygono-Chenopodietalia*). CÁCERES: Malpartida de Plasencia, la Bazagona (MAF 109857).

Orchis lactea Poiret in Lam., Encycl. Méth. Bot. 4: 494 (1798)

Claros de encinares y jarales sobre pequeños enclaves de calizas devónicas del territorio. CÁCERES: Romangordo, La Cañada (MAF 107297).

Ornithogalum orthophyllum Ten. subsp. **baeticum** (Boiss.) Zahar., Bot. Jour. Linn. Soc. 76: 356 (1978).

Pradezas juncuales nitrificadas (*Agropyro-Rumicion*). CÁCERES: Almaraz (MAF 109837).

Potamogeton trichoides Cham. & Schlecht., Linnaea 2: 175 (1827)

En aguas estancadas de pequeñas dimensiones no ácidas, neutras o ligeramente eutrofizadas (*Parvopotametalia*). CÁCERES: Almaraz, arroyo del Fino (MAF 109863).

Scirpus maritimus L., Sp. Pl. 51 (1753) var. **maritimus**

Sobre suelos arenosos no halófilos cubiertos por aguas profundas que en nuestro territorio se desecan durante el estío (*Scirpetum maritimi*). CÁCERES: Saucedilla, río Salado (MAF 109837).

Scolymus maculatus L., Sp. Pl. 813 (1753)

Macroterófito subnitrófilo crece sobre sustratos meso-eutrofos y suelos removidos o alterados (*Cynarenion humilis*). CÁCERES: Casatejada (MAF 108277).

Setaria geniculata (Lam.) Beauv., Agrost. 51, 178 (1812)

Cultivos de regadío en la vega del río Tiétar (*Panico-Setarion*). CÁCERES: Malpartida de Plasencia, la Bazagona (MAF 109861).

Sonchus asper (L.) Hill. subsp. **glaucescens** (Jordan) Ball, Jour. Soc. London (Bot.) 6: 548 (1878)

En praderas juncuales nitrificadas y pastoreadas por el ganado (*Agropyro-Rumicion crispi*). CÁCERES: Casatejada (MAF 108307).

Trifolium squamosum L., Amoen. Acad. 4: 105 (1759)

En praderas juncales de medios húmedos (*Junco inflexi-Menthetum suaveolentis*) y juncales sobre suelos arenosos meso-oligotrofos (*Holoschoeno-Juncetum acuti*). CÁCERES: Saucedilla (MAF 109917).

Veronica acinifolia L., Sp. Pl. ed. 2,19 (1762)

En pequeños declives encharcados en primavera sobre sustratos arenoso-silíceos (*Isoeto-Nanojuncetea*). CÁCERES: Casatejada (MAF 108275).

