

Anotaciones corológicas orensanas

Margarita Costa Tenorio (*) & Carlos Morla Juaristi (**)

Resumen: Costa, M. & Morla, C. *Anotaciones corológicas orensanas*. *Lazaroa*, 6: 263-266 (1984).

Se comentan una serie de táxones colectados en la comarca de Trives (Orense, España), que presentan interés corológico o ecológico.

Abstract: Costa, M. & Morla, C. *Chorological data from the province of Orense*. *Lazaroa*, 6: 263-266 (1984).

Several taxa collected in Trives (Orense, España) of chorological or ecological interest are briefly commented.

Se realizan algunas aportaciones corológicas que contribuyen a precisar el área de distribución gallega de ciertas especies poco citadas en la región o interesantes por su ubicación ecológica.

Arabis stenocarpa Boiss. & Reut., *Diagn. plant. nov. Hisp.* P.4.1842.

Este taxon aparece con frecuencia en la comarca de Trives, PG 55 89, en matorrales y formaciones aclaradas de *Quercus pyrenaica*. Su presencia en el occidente provincial ya era indicada por LAÍNZ (*Aport. con. fl. gall.* 6: 3, 4, 1975).

Aristolochia longa L., *Sp.* Pl.961.1753.

Merino no aporta ninguna localidad orensana en su Flora para esta especie, haciendo constar por otra parte su carácter común en la región litoral y zona marítima. Señalemos que en la comarca de Trives aparece con carácter esporádico en las cuencas inferiores de Jares y Bibey, PG 54 90.

(*) Departamento de Botánica, Facultad de Biología, Universidad Complutense, 28040 Madrid.

(**) Departamento de Botánica, Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma, 28049 Madrid.

Calamintha sylvatica subsp. **ascendens** (Jordan) P. W. Ball., Bot. Jour. Linn. Soc. 65: 346. 1972.

Aparece, no frecuente, en los alcornoques aclarados próximos a Larouco, PG 50 89.

Calepina irregularis (Asso) Thell. in Schinz & Keller, Fl. Schweiz ed. 2.1: 218. 1905.

Tras la primera indicación de LAÍNZ (Aport. con. fl. gall. 5: 7, 1967) aportamos una segunda localidad gallega para esta especie, con carácter espontáneo: Chandoiro, PG 52 88, linderos de cultivo cerealístico y claros de castaña.

Colchicum lusitanum Brot., Phyt. Lusit. 2: 211. 1827.

En las carballeiras de *Quercus pyrenaica* próximas a Pte. Navea, PG 42 91, escasa. Nuestros materiales presentan algunos caracteres intermedios o transicionales en relación con *C. multiflorum* Brot. (*C. neapolitanum* (Ten.) Ten.) según los criterios expuestos por D'AMATO (Caryologia 7: 292-349, 1955) y FERNÁNDEZ & FRANCA (Bol. Soc. Brot. 2. 51: 5-36, 1977), en particular los referentes a las relaciones dimensionales estilo/estambres y segmentos/longitud tubo periantio. Con relación a este taxon en Galicia cf. también LAÍNZ (Aport. Con. Fl. Gall. 4: 320. 1966, y 6: 34. 1968).

Corydalis claviculata (L.) DC. in Lam. & DC., Fl. fr. ed. 3.4: 638. 1805.

Laínez dio la primera localidad orensana concreta de esta especie en Las Ermitas, donde no parece ser común (LAÍNZ, Aport. Con. Fl. Gall. 3. 92. 1957). Nosotros hemos colectado este taxon euatlántico en las tierras medias y altas de Trives, donde es mucho más frecuente, siempre en ambientes umbrosos, C. de Manzaneda, PG 42 81, Trives, PG 43 88. CASTROVIEJO la recogía en sus inventarios del Invernadeiro (Est. Veg. S. Inver., 1977).

Crocus carpetanus Boiss. & Reut., Diagn. pl. nov. Hisp. 24. 1842.

Común en los pastizales montanos elevados, Cabeza de Manzaneda, PG 42 81. De Orense se citaba básicamente en las cadenas periféricas (LAÍNZ, Aport. Con Fl. Gall. 2: 552. 1956, 3: 97. 1957 y 4: 332. 1966).

Cytinus hypocistis (L.) L., Syst. Nat. ed. 12. 2: 602. 1767.

Taxon que MERINO señalaba en la cuenca baja del Miño y zona costera no consignando localidades orensanas (Fl. Galic. 2: 627. 1906). En la Sierra de Queixa aparece, aunque escaso, sobre *Halimium alyssoides*, PG 43 81, 1300 m.

Euphrasia nemorosa (Pers.) Wallr., Annus Bot. 82. 1815

Vidueira, PG 49 71, en prados muy húmedos y medios turbosos. Añadimos otra localidad de este taxon escasamente citado en Galicia (cf. MERINO, Fl. Gall. 2: 126. 1906, y LAÍNZ, Aport. Con. Fl. Gall.: 130. 1955).

Gagea nevadensis Boiss., Elenchus 85. 1838.

Hemos colectado este taxon, abundante, en los brezales próximos a Nagaza, PG 41 85. Su presencia en territorio gallego no es corriente, cf. MERINO (Fl. Gall. 3: 31. 1909) y LAÍNZ (Aport. Con. Fl. Gall. 154. 1955). Agradecemos a P. Montserrat el estudio de los materiales.

Hedypnois cretica (L.) Dum.-Courset, Bot. cult. 2: 339. 1802.

Sólo la hemos observado en la zona inferior de la comarca de Trives, en lugares secos, cunetas y taludes, Pte. Bibey, PG 47 88, Pontenovo, PG 49 93. No conocemos otras localidades orensanas para este taxon al que MERINO asignaba una distribución costera (Fl. Gall. 2: 442. 1906).

Hyacinthoides hispanica (Miller) Rothm., Feddes Reperit. 53: 14. 1944.

Relativamente frecuente en prados y taludes herbosos de la comarca de Trives, por encima de 800 m, también como subrupícola, Villariño de Conso, PG 52 69, Cabeza de Manzaneda, PG 42 81.

Inula conyza DC., Prod. 5. 464. 1836.

Taxon considerado escaso en Galicia por MERINO, que señalaba en Lugo (Fl. Gall. 2: 337. 1906), posteriormente DUPONT hace una indicación pontevedresa (Ad. Fl. N. O. L'Esp. 2: 271. 1959). Nosotros la hemos observado, abundante, en la cuenca inferior del río Navea, en claros de rebollar, PG 42 90. No conocemos otras indicaciones orensanas.

Lamium purpureum L., Sp. Pl. 579. 1753.

Aparece, aunque escasa, en los claros de encinar-alcornocal próximos a Larouco, PG 50 89. MERINO sólo la señalaba en La Coruña y Pontevedra (Fl. Gall. 2: 205. 1906), e IZCO la recoge recientemente en alguno de sus inventarios lucenses (Anal. R. Acad. Farm. 48, 1: 154 s. 1982).

Lathyrus articulatus L., Sp. Pl. 731. 1753.

Se encuentra muy localizada en la comarca de Trives, sólo la colectamos en los taludes estabilizados de la cuenca inferior del Jares, en solanas. PG 49 71.

Lobularia maritima (L.) Desv., Jour. Bot. Appl. 3: 162. 1814.

Aparece con carácter subespontáneo probablemente escapada de su cultivo ornamental en las tierras medias de Trives, en márgenes de senderos y cercanías de algunas aldeas, P. de Trives, PG 45 89.

Melilotus officinalis (L.) Pallas, Reise 3: 537. 1776.

Puede verse con cierta frecuencia en las cunetas y bordes de camino de la comarca de Trives, PG 47 88, siempre por debajo de los 800 m. No conocemos otras localidades orensanas de la misma, en Lugo ya la indicaba LAÍNZ (Aport. Con. Fl. Gall. 6: . 1968). También aparece en la zona *M. neapolitanum* Ten. aunque más esporádicamente.

Murbeckiella boryi (Boiss.) Rothm., Bot. not. 469. 1939.

Cabeza de Manzaneda, PG 45 77, grietas de roca, muy escasa. La ausencia de ejemplares fructíferos no permite por el momento establecer la posible relación de las plantas de Manzaneda con la subsp. *herminii* recientemente descrita por RIVAS MARTÍNEZ en la Sierra de Estrela (Anal. R. Acad. Farm. 46. 4: 475. 1981), no obstante nuestros materiales no son de mayor talla en general que los de la subespecie típica, carácter que parece ser común en las plantas estrellenses.

Ribes uva-crispa L., Sp. Pl. 201. 1753.

Asilvestrada en las tierras medias de Trives: Castro de Cotarones, PG 42 88, MERINO la indicaba cultivada en Pontevedra y La Coruña (Fl. Gall. 3: 562. 1909).

Rumex papillaris Boiss. & Reuter, Pugillus 107. 1852.

Relativamente frecuente en la comarca de Trives, en enclaves frescos de la zona media y superior: Taboazas, PG 36 84, Paradaseca, PG 29 76.

Ruta chalepensis L., Mantissa 69. 1967.

Castro de Cotarones, PG 42 87, Penapetada, PG 40 86. Añadimos estas localidades, donde aparece con carácter subespontáneo, a la única orensana, oriental, que conocemos (LAÍNZ,

Aport. con. Fl. Gall. 5: 19. 1968). *R. montana* (L.) L. es corriente en los ambientes térmicos de los cursos inferiores de Jares y Bibey.

Salix triandra L., Sp. Pl. 1016. 1753.

Taxon poco citado en Galicia, donde sólo conocemos dos localidades de MERINO (Fl. Gall. 2: 615. 1907), y la orensana de LAÍNZ situada en las márgenes del Sil a su paso por la Rúa (Aport. Con. Fl. Gall. 153. 1955). Nosotros hemos dado con varios ejemplares en la zona elevada de Cabeza de Manzaneda, PG 38 83, a más de 1400 m.

Salvia grahami Benth., Bot. Reg. t. 1370

Esta especie de origen centroamericano aparece asilvestrada en los contornos de Portomou-risco y Portela, PG 48 70, no conocemos otras indicaciones de este taxon para Galicia. En Cataluña ya había sido señalada por SENNEN (Cavanillesia 2: 29. 1929).

Saxifraga granulata subsp. **graniticola** D. A. Webb, Feddes Repert. 68: 207. 1963.

Entre los materiales que hemos recogido de la especie, los procedentes del valle inferior del Navea presentan con frecuencia caracteres que permiten referirlos al taxon que se cita. Cf. al respecto LAÍNZ (Aport. Con. Fl. Gall. 6: 16. 1968).

Saxifraga tridactylites L., Sp. Pl. 404. 1753.

MERINO señala esta especie en la zona oriental de Lugo (Fl. Gall. 1: 535. 1905), LAÍNZ la ha recogido en las calizas orientales orensanas (Aport. Con. Fl. Gall. 4: 16. 1968). Nosotros la hemos visto, abundante, en los pastizales terofíticos del valle inferior del río Bibey, Puebla de Trives, PG 47 87.

Scutellaria galericulata L., Sp. Pl. 599. 1753.

En los ambientes umbrosos del Jares inferior Chandoiro, PG 52 88. Taxon considerado «rarísimo» por MERINO en la región galaica, donde sólo lo indicaba en Pontevedra (Fl. Gall. 2: 215. 1906). Posteriormente LAÍNZ añade dos localidades, en Lugo y La Coruña (Aport. Con. Fl. Gall. 8: 16. 1974), no conocíamos sin embargo ninguna localidad orensana de la planta.

Spergularia bocconii (Scheele) Ascherson & Grabner, Syn. Mitteleur. Fl. 5 (1): 849. 1919.

Aparece como ruderal en la zona media-inferior de la comarca de Trives, PG 47 93, no muy abundante. MERINO no indicaba localidades orensanas (Fl. Gall. 1: 519. 1905).

Thypha latifolia L., Sp. Pl. 971. 1753.

Escasa en la comarca de Trives, sólo la hemos observado en la cuenca inferior del río Jares cerca de Portela, PG 54 38. En Galicia se indicaba de Pontevedra (MERINO, Fl. Gall. 3: 411. 1909; VIEITEZ, Anal. Edaf. 9: 438. 1950) y BELLOP recoge una localidad orensana en sus inventarios de la vegetación de Galicia (Anal. Jar. Bot. Madrid 24: 116. 1966).

Valerianella coronata (L.) DC. in Lam. & DC., Fl. Fr. ed. 3, 4: 241. 1805.

En taludes y zonas pedregosas de la comarca de Trives por debajo de 600 m, PG 47 93. Las referencias de esta especie en Galicia no son muy abundantes (MERINO, Fl. Gall. 2: 511. 1907; LAÍNZ, Aport. Con. Fl. Gall. 5: 41. 1967, y DUPONT, Ad. Fl. N. O. L'Esp. 2: 270. 1959).

En medios algo más húmedos y a mayor altitud también aparece *V. locusta* (L.) Laterrade subsp. *lusitanica* (F. Q.) Lainz.