

Contribución al conocimiento de la flora de León (España)

Félix Llamas, Rosario Carbó & Jaime Andrés (*)

Resumen: Llamas, F., Carbó, R. & Andrés, J. *Contribución al conocimiento de la flora de León (España)*. *Lazarou, 6: 283-285 (1984)*.

Se mencionan una serie de táxones que no se conocían de la provincia de León, o que presentan cierto interés corológico, haciéndose de algunos de ellos comentarios sobre su morfología y corología.

Abstract: Llamas, F., Carbó, R. & Andrés, J. *Contribution to the knowledge of the flora of León (Spain)*. *Lazarou, 6: 283-285 (1984)*.

In the present work are cited a series of new taxa for León Flora, or some others for their chorological interest. Some annotations about morphology and chorological meaning of some of them are made.

***Equisetum sylvaticum* L., Sp. Pl. 1061 (1953)**

Una población de este Pteridófito vive en el pinar de Puebla de Lillo (León) de donde fue citado por CARBÓ & *al.* (Acta Bot. Malac. 3: 63-120. 1977). Existe, además, otro testimonio de la misma localidad: F. Llamas, 6-6-1981 (LEB 12956).

LAÍNZ (Bol. Soc. Brot. 53: 29-54. 1979) supuso que la cita de CARBÓ & *al.* (l. c.) quedaba retractada por MAYOR & *al.* (Trab. Dep. Bot. Univ. Oviedo 1: 17-40. 1977), que la omitían debido a que su trabajo se refería únicamente a la provincia de Asturias. Las dudas posteriores suponemos quedarán resueltas (LAÍNZ, Inst. Est. Ast. Oviedo, 1982).

Deberá añadirse el punto UN 1 al Atlas Florae Europaeae de JALAS & SOUMINEN (1972).

***Ranunculus longipes* Lange ex Cutanda, Fl. Comp. Madrid, 103 (1861)**

Fue recolectada en el borde de una laguna en Chozas de Abajo (León) 4-5-1980 (30T TN 71) (LEB 9176). Según los datos bibliográficos que obran en nuestro poder se trata de una novedad provincial.

(*) Departamento de Botánica, Facultad de Biología, Universidad de León.

Arenaria obtusiflora G. Kunze subsp. **ciliaris** (Loscos) Font Quer, Collect. Bot. (Barcelona) 3: 348 (1953)

Hemos localizado este taxon en una ladera, sobre suelo arcilloso-calcáreo a la entrada de Cistierna (León) 30-5-1982 (30T UN 2740) (LEB 07727). No conocemos ninguna cita de esta planta en la provincia de León.

Presenta coloración variable en las anteras, de amarillo a rojo-vino, aunque algunas floras utilizan este carácter en la diferenciación de las especies.

Saxifraga x somedana J. A. Fdez. Prieto & T. E. Díaz, Anales Jard. Bot. Madrid 39 (2): 255 (1983)

(= *Saxifraga babiana* x *continentalis*)

Hemos herborizado este híbrido, recientemente descrito, en las cuarcitas sobre las que se asienta la presa del pantano de Barrios de Luna (León), 16-6-1981 (30T TN 65) (LEB 05672).

Según nuestros datos es la cita más meridional de este taxon.

Genista obtusiramea Gay ex Spach, Ann. Sci. Nat. ser. 3 (Bot.), 2: 116 (1845)

Hemos encontrado una pequeña población de esta especie en Camposagrado (León), 10-7-1982 (30 T TN 73) (LEB 9137). Convive con *Genista florida* L. subsp. *polygaliphylla* (Brot.) P. Cout.

La localidad que citamos es interesante por estar alejada al menos 25 km en línea recta de los lugares en que era conocida y a 1100 m de altitud, además de estar situada en el piso supramediterráneo del sector Palentino-Leonés (prov. Carpetano-Ibérico-Leonesa, región Mediterránea). Era conocida de la provincia Cántabro-Atlántica (región Eurosiberiana) y del sector Orensano-Sanabriense (prov. Carpetano-Ibérico-Leonesa, reg. Mediterránea).

Difiere morfológicamente del tipo de la especie por sus flores de mayor tamaño, hecho que se repite tanto en la región Mediterránea como en la Eurosiberiana.

Pyrola minor L., Sp. Pl. 396 (1753)

Recolectamos esta especie en un abedular existente en las inmediaciones del lago de La Baña (León), 20-6-1981 (29T PG 88) (LEB 9174). Ha sido citada frecuentemente en el norte de la provincia, siendo esta localidad interesante por estar en el extremo sur de la misma.

Streptopus amplexifolius (L.) DC. in Lam. & DC., Fl. Fr. ed. 3, 3: 174 (1805)

Hemos encontrado una población relativamente grande de esta especie en el circo del lago de La Baña (León) 20-6-1981 (29T PG 88) (LEB 9569). Se trata de una especie muy poco abundante en el noroeste peninsular que según nuestros datos no había sido citada de la provincia de León. De provincias limítrofes ha sido citada de Zamora (Lafnz & col., Bol. Inst. Est. Ant. Ser. C. 7: 35-81. 1963); Santander (Lafnz & col., Bol. Inst. Est. Ast. Ser. C. 1: 3-42. 1960); Palencia (Lafnz & col., l. c. 1963); Orense (Lafnz, An. Inst. Forest. Invest. 12: 1-51. 1987) y Asturias (DUPONT, Bol. Soc. Hist. Nat. Toulouse 91: 313-334. 1956, y MARTÍNEZ, Rev. Fac. Cienc. Oviedo, 15-16 N. S. (2): 145-200. 1975).

Allium scorzonerifolium Desf. ex DC. in Redouté, Liliacées 2: t. 99 (1804)

Geófito muy poco frecuente en la provincia de León, que hemos encontrado en Camposagrado (León), 13-6-1979 (30T TN 73) (LEB 12410) viviendo en brezales de la alianza *Ericion umbellatae*. Se conocía de otras dos localidades solamente.

Poa molinieri Balbis, Elenco 85 (1801)

A este taxon llevamos los materiales recolectados en las fisuras de las cuarcitas que forman los muros de contención del embalse de Barrios de Luna (León), 11-6-1981 (30T TN 65) (LEB

7497). Según nuestros datos se trata de la primera cita provincial de esta especie, cuya rareza o frecuencia están aún por definirse (cf. HERNÁNDEZ CARDONA, *Dissert. Bot.*, 46: 1-365. 1978).

Scirpus sylvaticus L., *Sp. Pl.* 51 (1753)

Encontramos una población bastante nutrida de esta especie en Las Salas (León), 11-6-1981 (30T UN 25) (LEB 9175). No conocemos citas anteriores de esta especie para la provincia.

Carex acuta L. *Sp. Pl.* 978 (1753)

Hemos encontrado esta especie en Crémenes (León), 30-5-1982 (30T UN 25) (LEB 9149). Se trata de un taxon muy poco citado y al parecer frecuente (cf. LAÍNZ & col., *Bol. Inst. Est. Ast. Ser. C.* 16: 159-206. 1973).

Carex lachenalii Schkuhr, *Beschr. Abbild. Riedgr.* 51 (1801)

Hemos herborizado este taxon en Peña Trevinca (León), 16-7-1982 (29T PG 88) (LEB 9168). Especie frecuente en el norte de la provincia que parece no haber sido citada en el sur de la misma.

Carex pseudocyperus L., *Sp. Pl.* 978 (1753)

Penetra en la provincia de León por Peña Rubia, 23-5-1982 (29T PH 70) (LEB 9148). Según nuestros datos esta es la primera cita provincial.

Carex rostrata Stoker in With., *Arr. Brit. Pl. ed. 2*, 2: 1059 (1787)

Hemos recolectado este taxon en las proximidades del lago de La Baña (León), 20-6-1981 (29T PG 88) (LEB 8606). Era conocida en la parte norte de la provincia.

