

Nuevos datos para la flora leonesa

Emilio Puente García, Carmen Pérez Morales &
María José López Pacheco (*)

Resumen: Puente, E., Pérez Morales, C. & López Pacheco, M. J. *Nuevos datos para la flora leonesa. Lazaroa*, 6: 297-299 (1984).

Se mencionan una serie de táxones cuya localización leonesa presenta interés desde el punto de vista corológico y ecológico.

Abstract: Puente, E., Pérez Morales, C. & López Pacheco, M. J. *New data for the flora of León. Lazaroa*, 297-299 (1984).

We mention some taxa, which location in the province of León is interesting, both from corological and ecological points of view.

Presentamos en esta nota varios táxones interesantes, resultado de nuestras campañas botánicas de los últimos años por distintos puntos de la provincia leonesa.

Los pliegos testigos se encuentran depositados en el Herbario LEB del Departamento de Botánica de la Facultad de Biología de la Universidad de León.

Para cada taxon se indica la cuadrícula UTM de 1 km de lado de la localidad donde se recolectó.

Alchemilla lapeyrousii Buser, Bull. Herb. Boiss. 1, App. 2: 18 (1893)

Esta rosácea, endemismo franco-ibérico, se conoce de varias localidades de la Cordillera Cantábrica: Peña Vieja (Santancer) (VICIOSO, Anal. Inst. Bot. Cavanilles, 6 (2): 35. 1946); Peña Redonda (LOSA & MONTSERRAT, Anal. Inst. Bot. Cavanilles, 10 (2): 494. 1952, y LOSA, Anal. Inst. Bot. Cavanilles, 13: 247. 1955); Picos de Europa (GUINEA, Geografía botánica de Santander: 298. 1953) y Peña Ubiña y Pto. de Pajares (ROMO, Collect. Bot. 14: 528. 1983). Fue colectada en Carbonera (30TTN7850), 6-VII-1978, en prados húmedos, LEB 11898.

Trifolium hybridum L., Sp. Pl. 766 (1753) subsp. **hybridum**

Taxon europeo recolectado en un charco seco de Tolibia de Abajo (30TUN0460), 8-VIII-1977, LEB 11932.

Citado anteriormente de Riaño, Piedras Luengas y Cervera (LOSA & MONTSERRAT, Anal. Inst. Bot. Cavanilles, 11 (2): 453. 1953, y LOSA, Anal. Inst. Bot. Cavanilles, 13: 244. 1955).

(*) Departamento de Botánica, Facultad de Biología, Universidad de León.

Trifolium patens Schreber in Sturm, Deutschl. Fl. Abt. 1, Band 4, Heft 16 (1804)

Terófito mediterráneo-atlántico herborizado en zonas nitrificadas de La Valcueva (30TTN9747), 12-VII-1977, LEB 11941. No citado hasta el momento para León, aunque varios autores lo señalan de las provincias limítrofes: Asturias, Santander y Lugo.

Helianthemum salicifolium (L.) Miller, Gard. Dict. ed. 8 n.º 21 (1768)

Cistácea de distribución mediterránea citada para nuestra provincia de Mansilla de las Mulas, LEB 9017 (PENAS MERINO, Lagascalia. 1982). Nosotros mencionamos hoy este caméfito de Pola de Gordón (30TTN8149), 29-V-1978, donde lo recogimos sobre sustrato calizo, LEB 11967.

También lo hemos visto en Campohermoso (30TUN0148), 19-V-1977, y Cabornera (30TTN7850), 27-VI-1978, igualmente en calizas.

Scabiosa columbaria L. subsp. **tineensis** Lainz, Mis contribuciones al conocimiento de la flora de Asturias: 64 (1982)

Dipsacácea recolectada en La Cueta (29TQH2966) sobre calizas cerca del Río Sil, 13-VIII-1981, LEB 11985, y en un prado sobre sustrato calizo, 2-IX-1981, LEB 11989, y en el Embalse de Las Rozas (29TQH1654), 17-VI-1982, en calizas del borde de la carretera, LEB 11993.

Son las primeras menciones leonesas de este taxon únicamente citado de Soto de la Barca (Tineo, Asturias) y La Malva (Somiedo, Asturias) (LAINZ, l. c.).

Carthamus lanatus L., Sp. Pl. 830 (1753)

Recolectada en Santa Lucía de Gordón (30TTN8450), 4-VIII-1977, LEB 12033. Nunca habíamos visto tan al norte en nuestra provincia esta compuesta de distribución submediterránea.

Pilosella lactucella (Wallr.) P. D. Sell & West. subsp. **bergidensis** (Lainz) Lainz, Mis contribuciones al conocimiento de la flora de Asturias: 73 (1982)

Asterácea herborizada en los pastizales psicroxerófilos silíceos (*Festucetea indigestae*) de Braña Caballo (30TTN8464), 27-VII-1981, LEB 12089.

LAINZ (Anal. Inst. Bot. Cavanilles, 14: 548. 1956) la señaló de Los Apóstoles (La Guiana, León) y FERNÁNDEZ PRIETO (Anal. Jard. Bot. Madrid 39 (2). 1982) del Teleno (29TQG19), lugar del que también existe un pliego en el Herbario LEB n.º 11882 leg.: F. Llamas (sub. *Hieracium flagelare* Willd. subsp. *flagelare*, 11-VII-1976). Rev.: T. E. Díaz, 20-XII-1982.

Hieracium pallidum Biv.-Bern. subsp. **graniticum** (Sch.-Bip.) Zahn, Hier. Alpes Marit. (1916)

Taxon orófilo sudoeste europeo, señalado de Leitariegos (Cangas de Narcea, Asturias) sobre rocas silíceas a 1600 m.s.n.m. (LAINZ, Mis contribuciones al conocimiento de la flora de Asturias: 73. 1982); de Llánaves de la Reina (León) (30TUN56); Teleno (29TQG19); subida Prieta desde Cardaño de Arriba (Palencia) (30TUN56) y Arroyo del Hospital (Curavacas, Palencia) (30TUN65) (FERNÁNDEZ PRIETO, Anal. Jard. Bot. Madrid, 39 (2). 1982) y de Llánaves de la Reina (León) (30TUN56), LEB 11885, leg.: Rivas-Martínez & al., 21-VII-1982.

Nosotros lo tenemos recogido del Muxaven (Lumajo, León) (29TQH2262), 7-VIII-1982, en pastizales psicroxerófilos silíceos, LEB 12155 y del Cueto de Arbas (León) (29TQH0963), 14-VIII-1982, en hábitats similares, LEB 12161.

Hieracium vogesiacum (Kirschleger) Fries subsp. **angliciforme** Zahn, Hier. Alpes Marit. (1916)

Hemicriptófito recogido en Redilluera (30TTN9961), 17-VII-1979, en zona rocosa silícea, LEB 12197, del que no conocemos menciones provinciales.

Hieracium fontanesianum Arvet-Touvet & Gaut., Hier. Gall. Hisp. (Exsicc.) 20: n.º 1590-1597 (1908)

A tal asterácea han de referirse las muestras recolectadas sobre calizas en La Cueta (29TQH2966), 20-VIII-1982, LEB 12240, una vez comparadas con el *isotypus* de B. de Retz, LEB 9586, recogido sobre calizas en Páramo (Asturias), 23-VII-1977. Creemos que se trata de la primera mención de este taxon para la provincia de León.

Micropyrum tenellum (L.) Link var. **aristatum** (Tausch) Pilger, Bot. Jahrb., 74 (4): 567 (1949)

A esta combinación varietal llevamos los ejemplares, de este terófito submediterráneo, herborizados en pastizales sobre sustrato silíceo de Campohermoso (30TUN0148), 17-V-1978, LEB 12280; Cascada del Arroyo de Valdecésar (30TUN0351), 9-VI-1978, LEB 23382; Alto de Aralla (30TTN7154), 10-VII-1980, LEB 23383; Villaseca de Laciána (29TQH2159) 22-V-1982, LEB 12283, y subida al Pto. de Leitariegos (29TQH1163), 17-VI-1982, LEB 12284, que son claramente aristados frente a otros materiales, abundantemente distribuidos por nuestra provincia de los que hay claros ejemplos en el Herbario LEB, que son míticos.

Stipa pennata L. subsp. **eriocaulis** (Borbás) Martinovský & Skalický, Preslia 41: 331 (1969)

Trinomen del que no conocemos citas provinciales y que señalamos de Cabornera (30TTN7850), 27-VI-1978, LEB 12324.

Agradecimientos

Queremos expresar nuestro agradecimiento al Dr. T. E. Díaz González por su ayuda en la realización de este trabajo.