

## Apuntes sobre la flora gallega, VI

Santiago Ortiz & Juan Rodríguez-Oubiña (\*)

**Resumen:** Ortiz, S. & Rodríguez-Oubiña, J. *Apuntes sobre la flora gallega, VI. Lazaroa, 10: 295-298 (1987). [Publicado en 1988].*

Se comentan 14 táxones de los cuales 8 son primera o segunda cita gallega. Se aporta además una localidad extrema occidental de *Hugueninia tanacetifolia* (L.) Reichenb. subsp. *suffruticosa* (Coste & Soulié) P. W. Ball: La Baña (León).

**Abstract:** Ortiz, S. & Rodríguez-Oubiña, J. *Apuntes sobre la flora gallega, VI. Lazaroa, 10: 295-298 (1987). [Date of publication 1988].*

In this paper, we comment on 14 interesting taxa, 8 of them are recorded for the first or second time in Galicia. We also indicate the finding of *Hugueninia tanacetifolia* (L.) Reichenb. subsp. *suffruticosa* (Coste & Soulié) P. W. Ball in La Baña (León). This place is the most occidental locality.

### **Anthyllis gerardi** L.

Lugo, Monforte de Lemos; 16.7.84; 29 TPH 2108.

Primera cita lucense de esta leguminosa conocida en Galicia de Ousense y Pontevedra (cf. MERINO, Fl. descr. ilustr. Gal. 1, 1905). WILLKOMM & LANGE (Prod. Fl. Hisp. 3, 1880) ya la señalaban en el litoral y algunas localidades de la Galicia interior según testimonio de Texidor.

### **Callitriche brutia** Petagna

A Coruña, Melide, Leboeiro; 4.6.85; 29 TNH 8449.

Taxon del que en Galicia sólo se conocían dos localidades, prácticamente contiguas, señaladas por MERINO (Fl. Galicia 2, 1906) en el extremo SO pontevedrés. Lo hemos recolectado en una poza profunda con agua turbia, apreciablemente contaminada.

---

(\*) Departamento de Biología Vegetal. Facultad de Farmacia. Universidad de Santiago de Compostela. E-15706.

**Cornus sanguinea L.**

Ourense, Carballeda, Sobradelo; 31.7.83; 29 TPG 7298.

La primera referencia gallega parece ser la de Sarmiento, que recoge PLANELLAS (Ensayo fl. faner. gall. 1852), concretamente «en Valdeorras» (Ourense), de la que MERINO (Fl. Galicia 3, 1909) y LAINZ (Aport. Fl. Gallega VI, 1968) se olvidan sin razón, en este caso, a la vista de nuestra nueva localidad. Por otro lado, tras las citas lucenses a orillas del Sil de MERINO (op. cit.) y de PLANELLAS in LAINZ (op. cit.) ya era previsible su presencia en Ourense y más concretamente en esa comarca. Crece allí abundante bajo chopos.

**Eruca vesicaria (L.) Cav. subsp. sativa (Miller) Thell.**

A Coruña, Arzúa; 23.5.85; 29 TNH 6552.

Es relativamente abundante en los bordes de la carretera Santiago-Lugo, en las cercanías de esta localidad, en ambiente de *Sisymbrium officinalis*. Primera cita provincial.

BELLOT (Anales Inst. Mutis Farmacog. 4 (7): 77-82, 1945) la citó por primera vez para Galicia tomando como base material herborizado por Viéitez en Lalín (Pontevedra). MERINO (op. cit., 1905) sólo incluía en su flora el género a pesar de existir en su herbario material de esta especie procedente de A Guarda (Pontevedra) (cf. LAINZ, Anales Inst. Forest. Inv. Exp. 10: 299-334, 1967).

**Gagea pratensis (Pers.) Dumort.**

Ourense, Carballeda, Teixadal de Pena Trevinca; 8.5.84; 29 TPG 8382; Carballeda, Lardeira; 8.5.84; 29 TPG 8093.

Dos nuevas localidades, también ourensanas, de lo que GÓMEZ VIGIDE (Anales Inst. Bot. Cavanilles 41 (2): 367-380, 1985) calificaba como «relevante novedad regional». En Lardeira cohabitaba con *Gagea nevadensis* Boiss.

**Eleocharis bonariensis Ness.**

A Coruña, Valdoviño, Loira, Embalse das Forcadas; 24.7.85; 29 TNJ 7428.; Arzúa, Brandeso, Embalse de Portodemouros; 6.6.85; 29 TNH 6947.

Pontevedra, Tomiño, Goián; 9.6.85; 29 TNG 2043.

Tres nuevas localidades de este taxon recientemente señalado por GARCÍA MARTÍNEZ & al. (Fl. Noroeste Penin. Iber. Exiccata, fasc. 2, 1985) de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra). En Europa —según WALTERS (Eleocharis R. BR. in TUTIN & al. (Eds.) Fl. Europaea, 5: 281-284, 1980)— sólo se encuentra naturalizado en el Oeste de Francia.

**Hugueninia tanacetifolia (L.) Reichenb. subsp. suffruticosa (Coste & Soulié) P. W. Ball.**

León, La Baña, cercanías del lago; 17.7.85; 29 TPG 8580.

La nutrida población hoy apuntada ocupa la localidad extrema conocida, por occidente, a buena distancia de la aportada por LAINZ (Bol. Inst. Estud. Astur., ser. C.22: 3-44, 1976) al norte de esta provincia: La Cueta (Cabrillanes).

Los pedicelos fructíferos no sobrepasan nunca los 8 mm (entrando, por tanto, en la variabilidad de la subespecie tipo) y a menudo no superan el mínimo de 7 mm que BALL [Hugueninia Reichenb.

in Tutin & al. (Eds.). Fl. Europaea 1: 267, 1964] concede a este taxon, en consonancia con parte del material cantábrico estudiado (cf. LAINZ, Bol. Inst. Estud. Astur., ser C.10: 173-218, 1964).

Por su situación de límite provincial es probable su aparición en Zamora y Ourense.

**Ornithogalum umbellatum** L. s.l.

Ourense, Carballeda, O Trigal; 30.5.84; 29 TPG 7794.

De este taxon únicamente se conocen en Galicia las citas de Vilardesilva (Rubiá, Ourense) (LAINZ, op. cit., 1967) y de San Clodio (Lugo) (IZCO, Anales Real. Acad. Farmacia 48: 147-150, 1982) de un inventario del *Linario-Calenduletum*.

Nuestros ejemplares fueron recolectados en un pastizal húmedo de las inmediaciones del pueblo.

**Paeonia officinalis** L. subsp. **microcarpa** (Boiss. & Reuter) Nyman

Ourense, Carballeda, Macizo de Pena Trevinca, valle del Arroio do Castiñeiro; 20.7.84; 29 TPG 8282.

Primera cita gallega de este taxon conocido de localidades leonesas próximas: Los Apóstoles y cerca de Corporales (LAINZ, Bol. Inst. Estud. Astur., ser C.16: 159-206, 1973; NIETO FELINER, Ruizia 2: 1-239, 1985). La referencia de PLANELLAS (op. cit.) a *Paeonia officinalis* L., sin aportar ninguna localidad, no debe ser tenida en cuenta, de hecho PAU (Brotéria, ser. bot. 19: 49-65, 1921) no la encontró entre sus pliegos.

**Primula elatior** (L.) Hill subsp. **intricata** (Gren. et Grodr.) Lüdi

Ourense, Carballeda, Pena Negra; 20.8.85; 29 TPG 8280.

GÓMEZ VIGIDE (op. cit.) señalaba la primera localidad gallega de la especie —sin indicar rango subespecífico— en Ponte Xares (A Veiga, Ourense), donde colonizaba barrancos húmedos. En similar ambiente ecológico vive en Pena Negra en contacto con formaciones referibles al *Allio-Veratretum albi*.

Ya se conocía de localidades leonesas próximas: Ferradillo (ROTHMALER, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 34: 147-155, 1934; NIETO FELINER, op. cit.), Cuevas del Sil (LAINZ, Collect. Bot. Barcelona 5 (2): 429-460, 1958) y Los Apóstoles (NIETO FELINER, op. cit.).

**Sisymbrium orientale** L.

A Coruña, Santiago de Compostela; 10.6.85; 29 TNH 3646.

No conocemos ninguna referencia a la existencia en Galicia de esta planta que por su localización en un muro de esta ciudad, fuera de su ambiente ecológico habitual, en medios nitrófilos varios, y su presencia puntual en nuestro territorio, puede considerarse aquí como especie adventicia.

**Spergularia segetalis** (L.) G. Don fil.

Ourense, Carballeda, Casaio; 1.7.84; 29 TPG 8288.

Primera cita gallega de esta especie, conocida de la vecina provincia de León (CARBO & al., Acta Bot. Malacitana, 3: 66-120, 1977).

Este terófito, que se comporta generalmente como mala hierba de centenal (*Aperetalia spicaventi*), se encontraba aquí formando parte de pastizales de la clase *Tuberarietea*. De igual modo, en

el Nordeste transmontano (Norte de Portugal) se comporta como compañera del *Taeniathero-Alysetum lusitanici* (cf. PINTO DA SILVA, Agronom. Lusit. 30 (3-4): 175-364, 1970) hoy incluido en la misma clase fitosociológica.

***Thypha angustifolia* L.**

**Pontevedra**, Sanxenxo, A Lanzada; 10.6.85; 29 TNH 1001.

Parece ser primera cita provincial y segunda localidad gallega que se conoce, pues ya ALLORGE (Bull. Soc. Bot. France, 74: 947-952, 1927) la da a conocer de Cambre (A Coruña). No obstante, este taxon había sido señalado con anterioridad por PAU (Brotéria, ser. bot. 21: 43-82, 1924) del herbario de Planellas sin que figure su localidad; por otro lado LAINZ (Brotéria, ser. bot. 22 (49): 155-168, 1953) hace referencia a un pliego sin datar del herbario de Merino, presumiblemente herborizado en Galicia.

***Veronica micrantha* Hoffmanns. & Link**

**A Coruña**, Santiago de Compostela; 9.6.85; 29 TNH 3646.

Efectivamente la *Veronica chamaedrys* L. var. *canescens* Merino debe llevarse a esta especie aunque sorprenda la falta de referencia al color de sus pétalos en la descripción. Señalemos de paso su presencia, en el herbario de Lourizán, entre plantas determinadas como *V. chamaedrys* L. var. *procera* Willk. procedentes de Brego (Verín, Ourense).

Nuestra cita es la primera provincial, pues sólo se conocía de Diomondi (Lugo) y Serra de Queixa (Ourense) (cf. MERINO, op. cit., 1906). Los abundantes ejemplares del herbario de Planellas fueron sacados a la luz por PAU (op. cit., 1924) sin localidad.