

## Notas sobre brioflora orensana (\*)

Juan Reinoso Franco & M.<sup>a</sup> del Carmen Viera Benítez (\*\*)

**Resumen:** Reinoso Franco, J. & Viera Benítez, M.<sup>a</sup> C. *Notas sobre brioflora orensana. Lazaroa 13: 187-189 (1992).*

Se citan 19 táxones nuevos o apenas conocidos para la provincia de Orense.

**Abstract:** Reinoso Franco, J. & Viera Benítez, M.<sup>a</sup> C. *Notes about the bryoflora of Ourense province (Spain). Lazaroa 13: 187-189 (1992).*

Nineteen taxa little known or recorded for the first time for the bryoflora of Orense province, are cited.

En esta primera nota damos a conocer una serie de hepáticas recolectadas en la Sierra de Invernadeiro (Orense), la mayoría muy poco conocidas hasta el momento en Galicia. Aquellos táxones que constituyen novedad provincial se señalan con un asterisco.

Los testimonios se encuentran depositados en la Sección de Briología del Herbario SANT.

\* **Bazzania tricrenata** (Wahlenb.) Lindb.

Sierra de Invernadeiro, alto do Cernadifío, 29TPG4164, sobre un talud húmedo, SANT-Bryo 2120.

Taxon señalado por primera vez en Galicia por REINOSO (cf. Impr. Univ. Sant. 30. 1982. Santiago), en la coruñesa localidad de Caaveiro; ésta y la que ahora aportamos son las únicas referencias gallegas conocidas.

**Calypogeia arguta** Nees & Mont.

Sierra de Invernadeiro, arroyo de Frigueira, 29TPG3962, sobre un talud al borde del agua, SANT-Bryo 2121.

Nueva localidad orensana a añadir a la inicial de Esgos proporcionada por ALLORGE (Rev. Bryol. Lichénol. 259. 1934).

\* **Aphanolejeunea microscopica** (Tayl.) Evans

Sierra de Invernadeiro, Lombo de Misueira, 29TPG3463, sobre corteza de roble en descomposición, SANT-Bryo 2122.

---

(\*) Trabajo financiado con cargo al proyecto D.O.G. 1612/87, de la Consellería de Educación de la Xunta de Galicia.

(\*\*) Departamento de Biología Vegetal (Botánica). Facultad de Biología. Universidad de Santiago de Compostela. 15706 Santiago de Compostela.

Diez años después del primer hallazgo en España (cf. REINOSO, Collect. Bot. 13 (1): 227. 1982), hemos vuelto a encontrar este taxon.

\* **Cololejeunea minutissima** (Sm.) Schiffn.

Sierra de Invernadeiro, alto de Touza, 29TPG4062, sobre corteza de roble, SANT-Bryo 2123.

\* **Frullania fragilifolia** (Tayl.) Gott.

Sierra de Invernadeiro, Lama, 29TPG4059, sobre corteza de roble, SANT-Bryo 2124.

Las únicas referencias gallegas se deben a BUCH (Rev. Bryol. Lichénol. 49. 1934), que cita la especie en la localidad pontevedresa de Fornelos, cerca de El Grove, y REINOSO (Acta Bot. Malacitana 10: 20. 1985), que recoge la planta en los bosques de Caaveiro.

\* **Conocephalum conicum** (L.) Underw.

Sierra de Invernadeiro, collado das Rubias, 29TPG3865, en un talud húmedo, SANT-Bryo 2138.

Nueva localización orensana a añadir a la ya conocida de Sobrado (ALLORGE, Sch. Bryoth. Iber. 3. 1929. París).

\* **Frullania microphylla** (Gott.) Pears.

Sierra de Invernadeiro, fraga da Pena, 29TPG4167, frecuente sobre avellanos, SANT-Bryo 2125.

Las dos únicas referencias gallegas para este taxon se deben a BUCH (*loc. cit.* 49. 1934) y REINOSO (*loc. cit.* 20. 1985).

\* **Harpalejeunea ovata** (Hook.) Schiffn.

Sierra de Invernadeiro, Anxiñeira, 29TPG3661, sobre tronco de roble en descomposición, SANT-Bryo 2126.

Recientemente hemos dado a conocer el mapa de distribución de esta hepática en Galicia (cf. REINOSO & VIERA, Bol. Soc. Brot. 64. 1992.).

\* **Lejeunea ulicina** (Tayl.) Gott.

Sierra de Invernadeiro, Ribeira Grande, 29TPG4065, sobre troncos de acacia, SANT-Bryo 2127.

Se trata de la cita más meridional en Galicia, las anteriores de CASARES (Trab. Mus. Nac. Ci. Nat., Ser. Bot. 46. 1915), BUCH (*loc. cit.* 52. 1934), ALLORGE (*loc. cit.* 265. 1934) y REINOSO (*loc. cit.* 21. 1985) corresponden a localidades costero-atlánticas.

\* **Lepidozia pearsonii** Spruce

Sierra de Invernadeiro, Val de Figueiro, 29TPG3668, sobre roble en descomposición, SANT-Bryo 2128.

Representa una notable aportación para la brioflora de Galicia, ya que Caaveiro constituía la única localidad conocida hasta el momento (cf. REINOSO, *loc. cit.* 21. 1985).

\* **Lepidozia reptans** (L.) Dum.

Sierra de Invernadeiro, Cabeza do Cernado, 29TPG4163, en talud húmedo, SANT-Bryo 2129.

Nuestra cita completa las anteriores de ALLORGE (*loc. cit.* 260. 1934) y REINOSO (*loc. cit.* 21. 1985) como únicas hasta el momento en Galicia.

\* **Lophocolea heterophylla** (Schrad.) Dum.

Sierra de Invernadeiro, Ribeira Pequena, 29TPG3764, sobre pino, SANT-Bryo 2130.

A la cita orensana hay que añadir las ya conocidas de CASARES (Mus. Nac. Ci. Nat. 512. 1919.), RUGBY (Bot. Not. 168. 1964), JOVET-AST & BISCHLER (Rev. Bryol. Lichenol. 965. 1976) y REINOSO (*loc. cit.* 21. 1985), como únicas referencias regionales.

\* **Marsupella emarginata** (Ehrh.) Dum.

Sierra de Invernadeiro, arroyo de Agralleira, 29TPG3867, sobre piedras dentro del agua, SANT-Bryo 2131.

El taxon era conocido hasta el momento en localidades dispersas de la costa atlántica gallega, los montes de Invernadeiro constituyen la zona más meridional.

\* **Metzgeria conjugata** Lindb.

Sierra de Invernadeiro, Vegas de Meda, 29TPG3766, sobre corteza de sauce, SANT-Bryo 2132.

La localidad orensana amplía el área de distribución en Galicia, hasta el momento sólo nos constan las referencias bibliográficas de REINOSO (*loc. cit.* 22. 1985) y REINOSO & ÁLVAREZ (Acta Cient. Compost. 276. 1985.), que señalan la planta en los bosques de Caaveiro y en las cercanías de Santiago respectivamente.

\* **Nowellia curvifolia** (Dicks.) Mitt.

Sierra de Invernadeiro, arroyo de Cabaloiro, 29TPG3967, sobre roble en descomposición, SANT-Bryo 2133.

Sorprende la aparición de esta hepática euroceánica en la zona. Hasta el momento, segunda cita regional, después de haber sido dada a conocer por nosotros (*cf.* REINOSO, *loc. cit.* 22. 1985).

\* **Phaeoceros laevis** (L.) Prosk.

Sierra de Invernadeiro, Lombo de Misueira, 29TPG3463, talud rezumante, SANT-Bryo 2134.

\* **Radula complanata** (L.) Dum.

Sierra de Invernadeiro, Figueira Grande, 29TPG3669, sobre muro de contención, SANT-Bryo 2135.

\* **Riccardia multifida** (L.) S. F. Gray

Sierra de Invernadeiro, arroyo Puxo de Mogos, 29TPG3769, sobre piedras sumergidas, SANT-Bryo 2136.

\* **Scapania gracilis** Lindb.

Sierra de Invernadeiro, alto da Touza, 29TPG4062, sobre roble, SANT-Bryo 2137.