

Aportaciones al conocimiento de la flora diánica

M.^a Rosa Pérez-Badia (*)

Resumen: Pérez-Badia, M. R. *Aportaciones al conocimiento de la flora diánica. Lazaroa 16: 201-204 (1996).*

Se aportan nuevas localidades de táxones recolectados en el territorio diánico (comarca de La Marina Alta, Alicante) que constituyen primeras citas provinciales o tienen una distribución territorial poco conocida.

Abstract: Pérez-Badia, M.R. *Contributions to the knowledge of Dianic Flora. Lazaroa 16: 201-204 (1996).*

New records for taxa collected in Dianic country (La Marina Alta, Alicante) are presented. They constitute first records for Alicante province or new localities of taxa of scarcely known territorial distribution.

***Anthemis altissima* L.**

Alicante: Vall de Gallinera, Benissivà, 30SYJ4000, 300 m, campos de secano de almendros, 22-VIII-1992, R. Pérez-Badia, MAF 147356; Pego, 30SY5102, herbazales subnitrófilos, 9-V-1993, R. Pérez-Badia, MAF 147355.

Especie bastante rara en el conjunto del territorio valenciano, no señalada hasta ahora de la provincia de Alicante. Se trata de un terófito propio de las comunidades arvenses de *Fumaria wirtgenio-agrariae* Brullo in Brullo & Marceno 1985, representadas en la zona por la asociación *Calendulo-Chrysanthemum paludosum* O. Bolòs 1975. También lo hemos encontrado formando parte de otras comunidades subnitrófilas de *Ruderali-Secalieta* Br.-Bl. 1936, así como en bordes de caminos y ribazos.

(*) Departamento de Biología Vegetal (Botánica). Escuela Universitaria de Gandía, Universidad Politécnica de Valencia. Carretera Nazaret-Oliva, s/n. E-46730 Gandía, Valencia, España.

***Anthemis cotula* L.**

Alicante: Vall de Alcalà, Alcalà de la Jovada, 30SYH4198, 600 m, 14-VIII-1988, R. Pérez-Badia, MAF 147357; Vall de Gallinera 30SYJ3799, 450 m, herbazales subnitrófilos, 1-VII-1991, R. Pérez-Badia, MAF 147358.

Segunda cita provincial de la planta (BALLESTER & STÜBING, Sierra del Carrascal de Alcoy. Flora y Vegetación. Publ. Caja Prov. Alicante: 32, 1990). Conocida además de Castellón y Valencia (MATEO & M. B. CRESPO, Claves para la flora valenciana. Ed. Del Cénia al Segura, Valencia, 1991), siendo propia de cultivos y pastizales más o menos nitrófilos (*Ruderali-Secalieta* Br.-Bl. 1936).

***Anthemis tuberculata* Boiss.**

Alicante: Vall de Alcalà, Alcalà de la Jovada, 30SYH3798, 600 m, campos de cereal, 3-VI-1993, R. Pérez-Badia, MAF 147360; Vall de Alcalà, Beniaia, 30SYH3796, 600 m, cultivo cerealista, 25-IV-1993, R. Pérez-Badia, MAF 147359.

Se amplía el área de esta planta, herborizada en las comunidades de *Secalieta* *cerealis* Br.-Bl. 1931 del noreste provincial. Se conocía hasta el momento de la Carrasqueta (RIGUAL, Flora y Vegetación de la provincia de Alicante. Instituto de Estudios Juan Gil Albert, Diputación Provincial de Alicante, ed. 2. 1984) y de Bañeres (DE LA TORRE & al., Anales Biol. (Murcia) —en prensa—).

***Aphanes arvensis* L.**

Alicante: Vall d'Ebo, 30SYH4296, 735 m, pastizales vivaces pastoreados, 8-V-1994, R. Pérez-Badia, MAF 147361.

Constituye la segunda referencia provincial para esta especie, conocida hasta el momento de la Sierra de Aitana (SOLANAS & al., Anales Jard. Bot. Madrid 51(1): 133-134. 1993). Se ha encontrado en comunidades de *Poetea bulbosae* Rivas Goday & Rivas-Martínez in Rivas-Martínez 1978.

***Centaurium tenuiflorum* (Hoffmans. & Link) Fritsch**

Alicante: Alcalali, río Xaló, 30SYH5793, 180 m, pastizales húmedos, 8-V-1994, R. Pérez-Badia, MAF 147363; Vall d'Ebo, 30SYH4699, 380 m, pastizales húmedos, 8-V-1994, R. Pérez-Badia, MAF 147362; Xàbia, 31SBC4998, 100 m, pastizales húmedos, 24-VI-1991, R. Pérez-Badia, MAF 147365; Orba, río Girona, 30SYH5397, 140 m, pastizales húmedos, 28-V-1992, R. Pérez-Badia, MAF 147364.

Con nuestras citas se amplía la distribución territorial de esta planta, cuya presencia en la provincia de Alicante fue dada a conocer recientemente (SOLER & al., Anales Jard. Bot. Madrid 53(1): 103-114. 1995), y que es relativamente frecuente en la comarca de la Marina Alta, donde forma parte de comunidades de *Molinio-Holoschoenion* Br.-Bl. ex Tchou 1948.

***Cichorium pumilum* Jacq.**

Alicante: Tormos, 30SYH5398, 200 m, pastizales subnitrófilos, 28-V-1992, R. Pérez-Badia, MAF 147367; Sierra de Bèrnia, 30SYH5885, 500 m, pastizales subnitrófilos, 6-VI-1993, R. Pérez-Badia, MAF 147366.

Ampliamos el área de esta planta, que siendo relativamente frecuente en el centro-sur de la provincia (Alto Vinalopó: DE LA TORRE, Flora, vegetación y suelos de la Sierra del Maigmo (Alicante). Publ. Caja Ahorros Provincial Alicante. 1989), no se conocía del norte provincial, donde aparece en pastizales más o menos nitrófilos de *Ruderali-Secalieta* Br.-Bl. 1936.

***Cirsium valentinum* Porta & Rigo in Porta**

Alicante: Castells de Serrella, 30SYH4691, 800 m, matorral, 29-V-1993, R. Pérez-Badia, MAF 147368.

Añadimos una nueva localidad de este endemismo setabense, descrito por PORTA & RIGO (Atti. Acad. Agiati 9: 38. 1892) a partir de materiales de la Sierra de Mariola. Esta cita se une a

las ya indicadas por RIGUAL (*op. cit.*) y constituye uno de los puntos más nororientales de la distribución conocida de esta especie, característica de *Carthametalia lanati* Brullo in Brullo & Marceno 1985.

Cuscuta planiflora Ten.

Alicante: Xàbia, 31SBC5599, 150 m, matorral litoral termófilo, 24-VI-1991, R. Pérez-Badía, MAF 147431.

No tenemos conocimiento de la existencia de citas anteriores de esta planta en la provincia, aunque debe encontrarse relativamente extendida. La hemos herborizado formando parte del matorral de *Erico-Lavanduletum dentatae* O. Bolòs 1957.

Lathyrus sativus L.

Alicante: Benissa, 31SBC4085, 140 m, subespontánea en herbazales subnitrofilos de *Ruderali-Secalietae cerealis*, 1-V-1991, R. Pérez-Badía, MAF 147369.

Aunque de forma genérica MATEO & M. B. CRESPO (*op. cit.*) indican su presencia en la provincia, no conocíamos referencias concretas de esta especie, que debió estar mucho más extendida en épocas pasadas. El abandono de su cultivo ha hecho que actualmente sea bastante escasa.

Logfia minima (Sm.) Dumort.

Alicante: Castells de Serrella, 30SYH4590, 800 m, pastizales terofíticos, 29-V-1993, R. Pérez-Badía, MAF 147370.

Segunda cita provincial (NEBOT & al., Anales Biol. (Murcia) 16: 99-129, 1990) de esta especie silicícola, que en el territorio se presenta formando parte de pastizales anuales de *Helianthemetea guttati* (Br.-Bl. in Br.-Bl. & al. 1952) Rivas Goday & Rivas-Martínez 1963, desarrollados sobre suelos parcialmente descarbonatados.

Symphytum tuberosum L. subsp. **tuberosum**

Alicante: Vall de Gallinera, 30SYJ4402, 300 m, herbazales sombríos, 10-IV-1994, R. Pérez-Badía, MAF 147371.

Las localidades hasta ahora conocidas de esta planta corresponden a la zona de Alcoi (CÁMARA, Bol. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 36: 307-314, 1936) y Agres (MATEO & NEBOT, Anales Jard. Bot. Madrid 45(1): 307-308, 1988); con nuestra cita se amplía su área hasta el noreste de la provincia, donde forma parte de las orlas herbáceas de las olmedas de *Acantho-Ulmetum minoris* Costa, Peris & Stübing inéd.

Theligonum cynocrambe L.

Alicante: Vall de Gallinera, 30SYJ4402, 300 m, comunidades escionitrófilas, 10-IV-1994, R. Pérez-Badía, MAF 147372.

Primera referencia para la flora valenciana de esta planta, cuyas citas más próximas conocidas corresponden a las Islas Baleares (O. BOLÒS & VIGO, Flora dels Països Catalans, I. Ed. Barcino, 1984). Se presenta formando parte de las comunidades escionitrófilas de *Soncho-Parietarium lusitanicae* Esteve 1973.

Trifolium glomeratum L.

Alicante: Castells de Serrella, 30SYH49, majadales y pastizales terofíticos subnitrofilos, 30-V-1993, R. Pérez-Badía, MAF 147374; Vall d'Ebo, 30SYH49, 8-V-1994, R. Pérez-Badía, MAF 147375.

Segunda cita provincial de esta especie, que en el territorio forma parte de comunidades de *Poetalia bulbosae* Rivas Goday & Rivas-Martínez in Rivas Goday & Ladero 1970 y de pastizales subnitrofilos de *Taeniathero-Aegilopion geniculatae* Rivas-Martínez & Izco 1977. La referencia anterior fue aportada por SOLER & al. (Anales Jard. Bot. Madrid 53(1): 103-114, 1995).

Trifolium cherleri L.

Alicante: Castells de Serrella, 30SYH49, pastizales terofíticos, 30-V-1993, R. Pérez-Badia, MAF 147373.

A las localidades indicadas por ROUY (Bull. Soc. Bot. France 31: 33-44. 1884) y MOLERO & ROVIRA (Anales Jard. Bot. Madrid 38(1): 303-305. 1981) de la zona de Gata de Gorgos, hay que añadir esta cita que corresponde al interior de la comarca de la Marina Alta, donde forma parte de pastizales subnitrofilos de *Taeniathero-Aegilopion geniculatae* Rivas-Martínez & Izco 1977.

Trifolium subterraneum L.

Alicante: Vall d'Ebo, 30SYH4296, 735 m, majadales, 8-V-1994, R. Pérez-Badia, MAF 147378.

Primera cita provincial de esta especie, característica de la clase *Poetea bulbosae* Rivas Goday & Rivas-Martínez in Rivas-Martínez 1978.

Trigonella gladiata Steven ex Bieb.

Alicante: Vall d'Alcalà, Alcalà de la Jovada, 30SYH3795, 660 m, comunidades anuales de *Helianthemetea guttati*, 3-VI-1993, R. Pérez-Badia, MAF 147376.

Añadimos esta localidad a las conocidas de Alcoi (SERRA & al., Fol. Bot. Misc. 9: 35-42. 1993) y Sierra de Mariola (PAU, Actas Soc. Esp. Hist. Nat. 27: 411-452. 1898; NEBOT & MATEO, Actas Congr. Hom. Carlos Pau: 113-121. 1988).

Trisetum scabriusculum (Lag.) Cosson ex Willk.

Alicante: Castells de Serrella, 30SYH4590, 800 m, pastizales anuales de *Helianthemetea guttati*, 29-V-1993, R. Pérez-Badia, MAF 147377.

Segunda cita provincial tras las de RIGUAL (*op. cit.*) de Jijona y Cabeço d'Or.

Valerianella locusta (L.) Laterrade subsp. *locusta*

Alicante: Vall d'Ebo, 30SYH4496, 500 m, comunidades arvenses de *Diplotaxion erucoidis*, 9-V-1991, R. Pérez-Badia, MAF 147379.

Primera cita provincial.

Valerianella muricata (Steven ex Bieb.) J. W. Loudon

Alicante: Vall d'Ebo, 30SYH4296, 735 m, pastizales terofíticos subnitrofilos, 8-V-1994, R. Pérez-Badia, MAF 147380.

Primera cita para la provincia de Alicante.

Vicia ervilia (L.) Willd.

Alicante: Vall d'Alcalà, Beniaia, 30SYH3795, 680 m, herbazales subnitrofilos, 25-IV-1993, R. Pérez-Badia, MAF 147381.

Esta cita se añade a la de Famorca (SOLANAS & MATEO, Butll. Inst. Cat. Hist. Nat. 59: 75-79. 1991) y a las indicaciones genéricas de BOLÒS & VIGO (*op. cit.*) sobre su área alicantina.

Viola kitaibeliana Schultes in Roemer & Schultes

Alicante: Vall de Gallinera, 30SYJ3699, 700 m, comunidades anuales de *Helianthemetea guttati*, 15-IV-1992, R. Pérez-Badia, MAF 147382.

Segunda cita provincial de esta planta, cuya única localidad conocida hasta el momento correspondía al Maigmo (DE LA TORRE & al., Anales Biol. (Murcia) 13: 39-42. 1987).