

# Lectotipificación de la asociación *Adiantum-Pinguiculetum longifoliae* Fern. Casas 1970

F. Javier Fernández Casas (\*) & José Luis Benito Alonso (\*\*)

**Resumen:** Fernández Casas, F.J. & Benito Alonso, J. L. *Lectotipificación de la asociación Adiantum-Pinguiculetum longifoliae* Fern. Casas 1970. *Lazaroa* 20: 114 (1999).

Proponemos la lectotipificación de la asociación *Adiantum-Pinguiculetum longifoliae* Fern. Casas 1970, y sinonimizamos a ésta el sintaxon *Pinguiculo longifoliae-Adiantetum capilli-veneris* Rivas Mart. & al. 1991, nombre inválido al haber sido descrito sin designación de tipo nomenclatural.

**Abstract:** Fernández Casas, F.J. & Benito Alonso, J. L. *Lectotypification of Adiantum-Pinguiculetum longifoliae* Fern. Casas 1970. *Lazaroa* 20: 114 (1999).

The lectotypification of *Adiantum-Pinguiculetum longifoliae* Fern. Casas 1970, a community from leaky limestone (*Adiantion*) endemic to the Spanish Central Pyrenees, is proposed. Moreover, *Pinguiculo longifoliae-Adiantetum capilli-veneris* Rivas Mart. & al. 1991, a name invalidly published because no type was indicated, must be considered a synonym of the former.

La asociación *Adiantum-Pinguiculetum longifoliae* es una comunidad propia de las grietas profundas de los roquedos calizos rezumantes (*Adiantion* Br.-Bl. ex Horvatic 1934) del piso montano inferior del Pirineo central aragonés, donde se ciñe a las cuencas de los ríos que vierten al Cinca. Fue descrita por uno de nosotros (Fernández Casas, *Ars. Pharm.* 11: 278. 1970) en un trabajo en el que se daban a conocer diversas unidades de vegetación, principalmente de roquedos y gleras. La asociación que nos ocupa quedó sin la correspondiente designación de tipo nomenclatural. Sin embargo, está válidamente publicada según el CPN, al haberse hecho pública antes de 1 de enero de 1979 y no transgredir, por tanto, el artículo 5.

Años más tarde de la publicación del *Adiantum-Pinguiculetum*, Rivas Martínez & al. (*Itinera Geobot.* 5: 404-406. 1991) describen el *Pinguiculo longifoliae-Adiantetum capilli-veneris*, asociación que estimamos es la misma que la que comenta-

mos al principio. Dicho sintaxon es inválido al no haberse designado un tipo nomenclatural cuando fue propuesto (Art. 5), y en caso de validación, sería ilegítimo por homonimia posterior (Art. 32d).

El artículo 19 del CPN obliga a la designación de un lectotipo para los nombres válidos a los que no se les hubiera atribuido un tipo. Procedemos, así, a designarlo en el primer inventario de la tabla diagnóstica, procedente de Murillo de Liena (valle del Ésera, Huesca), y a completar el nombre de acuerdo con la Rec. 10D del CPN.

***Adiantum capilli-veneris-Pinguiculetum longifoliae***  
Fern. Casas 1970 [*Ars. Pharm.* 11: 278, 292. 1970]

*Lectotypus* (designado aquí): Fernández Casas, *op. cit.*: 292, tab. 6 («*Adiantho-Pinguiculétum*»), invent. 1. 1970.

*Syn.*: *Pinguiculo longifoliae-Adiantetum capilli-veneris* Rivas Mart., Bäscones, T.E. Díaz, Fern. Gonz. & Loidi 1991 [*Itinera Geobot.* 5: 404-406], *nom. inval.* (Art. 5).

\* Real Jardín Botánico, C.S.I.C. Plaza Murillo 2. E-28014 Madrid (España).

\*\* Instituto Pirenaico de Ecología, C.S.I.C. Apto. 64. E-22700 Jaca, Huesca (España).